

Материяли по флората на Родопитѣ.

Отъ А. Тошевъ.

Тия материяли произлизатъ отъ една екскурзия, която лани (1900.) прѣзъ юлия направихъ по Родопитѣ. Ала прѣди да пристапя бѣмъ подробно изложение на материялитѣ по растителността на нѣкои части отъ тѣзи планини, смѣтамъ за нужно, за по-голѣма ясность, да обрисувамъ въ общи черти цѣлитѣ Родопи.¹⁾

I.

Подъ името *Родопи* днесъ се разбира само източната частъ отъ голѣмата планинска група, която завзема пространството между коритата на Струма и Марица. Сѣщинскитѣ Родопи съставятъ най-голѣмия дѣлъ отъ Родопската планинска система: тѣ завземаатъ грамадно пространство между коритата на Места и Марица, начинайки отъ изворитѣ имъ дори до Бѣло море.

Родопитѣ се отличаватъ по външния си видъ както отъ Рила, така и отъ Пиринската планинска система: тѣ сж извънмѣрно разпространени надлъжъ и наширь. Отъ главното вододѣлно било между Места и Марица излизатъ грамадни клонове, които въ началото си сж толкова високи, колкото и главното било, и съставятъ успоредни гребени съ него. Отъ тѣхъ пъкъ множество разклонения вървѣтъ отъ една страна на с., на с.-и. и на и. къмъ долината на Марица и се толкова разстилатъ, че образуватъ отдѣлни планински вериги съ свои склонове и разклонения. Отъ друга страна подобни тѣмъ, само че по-къси склонове слизатъ на з., ю.-з. и ю. и опиратъ до долината на Места. Грамадното пространство между Места, Пловдивската, Одринската и крайморската Гюмюрджинска равнина прѣдставя единъ хаосъ отъ клонове и разклонения, прѣсѣчени по всички посоки отъ рѣки, потоци и долчини.

¹⁾ Нѣкои отъ свѣдѣнията за общата характеристика на Родопитѣ ми съобщилъ г. В. Канчовъ, комуто гукъ изказвамъ своята благодарность.

Друго важно отличие на сщцинскитѣ Родопи отъ двѣтѣ други вериги е това, че тѣ сж населени речи до върховетѣ си съ села и колиби. Клоноветѣ имъ изобщо иматъ умѣрено стрѣмни спускове и гладки трѣвисти била, а долините между тѣхъ постоянно се повдигатъ до най-високитѣ части; затуй навсѣдѣ комай има пѣтища. Единъ редъ котловини въ източнитѣ склонове на Родопитѣ се простира отъ най-сѣверозападния имъ край до най-югоизточния и е така гъсто населенъ, както рѣдко нѣйдѣ на друго мѣсто въ полуострова. Краищата на всички Родопски склонове, които гледатъ къмъ Пловдивското поле, се свършватъ съ стрѣмни варовити спускове, просѣчени отгѣсно отъ Родопскитѣ рѣки. Сѣверозападнитѣ краища на Родопитѣ, колкото се по-приближаватъ къмъ Рила, толкова по-приличатъ на нея. Она дѣлъ, който се намира между изворитѣ на Места и Марица, има чисто рилски изгледъ. Тукъ сж сщцитѣ островърхи скалисти чалове, сщцитѣ страховити пропасти съ планински езера около тѣхъ, сщцитѣ диви недостъпни и ненаселени планински усои, между които текатъ бѣсни потоци. Въ срѣднитѣ си части Родопитѣ заприличватъ на Пиринъ; тукъ-тамъ се появяватъ по главното било дългнесте алпийски поляни, а отдѣлнитѣ върхове бавно се издигатъ намѣстѣ сводовито надъ билото. Сжщо така южнитѣ части на Родопитѣ сж сродни съ южнитѣ части на Пиринската система. И тукъ отдѣлни вериги вървѣтъ отъ з. къмъ и. като продължение отъ Бозъ-дагъ и заграждатъ една голѣма крайморска равнина.

Върхътъ *Манчо* (2345 м.) стои на главната планинска верига. Въ сѣвероизточнитѣ му склонове сж изворитѣ на Марица, а въ югоизточнитѣ — изворитѣ на Бѣла-Места. Право на и. отъ Манчо се отдѣля единъ високъ клонъ съ чисто рилски характеръ, който се спуща дори до Марица съ стрѣмни склонове и образува западната стѣна на Марицината Момина-клисура. Ако гледаме външния видъ на тоя клонъ, трѣба да го причислимъ къмъ Рилската верига. Географски той дѣли Македония отъ Тракия, затуй го поставяме къмъ сщцинската Родопска верига. На и. отъ Манчо се издигатъ редъ високи чалове, каквито сж: *Муста-чалъ*, *Мусановъ-чалъ*, *Каменити чалъ* (Тапли-чалъ) и по-нататѣкъ колосалниятъ *Белмекенъ* или *Равни-чалъ* (2641 м.)¹⁾ най-високъ въ тоя планински дѣлъ, който стига съ два клона до Момина-клисура — единъгъ надъ с. Сестримо, другиятъ надъ Голѣмо-Бѣльово. Въ южнитѣ

¹⁾ 2611 м. по Бояджиева.

склонове на Мусановъ чалъ има планинско езеро Леевица, отъ което водата отива въ Бѣла-Места. Въ южнитѣ поли на Каменити чалъ се намиратъ двѣ езерца, отъ които се начева Черна-Места.

Доспатъ планина.

Южно отъ Белмекенъ се спуща покрай лѣвия брѣгъ на Черна-Места планина *Самаръ* съ срѣдна височина около 2000 метра, и съ нея се начева собствено сѣверозападниятъ дѣлъ отъ Родопската планинска система, който носи общо име *Доспатъ планина* или *Доспатъ-дагъ* у Турцитѣ. Въ южния си край Самаръ планина се снишава повечко, та се образува високъ планински прѣслапъ, който е най-сгодното мѣсто за минаване отъ македонския Разлогъ за тракийското Чепино и по-нататъкъ до Пловдивското поле. Този проходъ е високъ около 1200. м. Понеже Разложката и Чепинската котловина стоѣтъ 800—850 м. високо, проходътъ е лесно достъпенъ и единъ отъ най-добритѣ въ цѣлата Родопска верига. Този важенъ проходъ се именува обикновено *Разложки*. Понеже има прилика на самаръ или сѣдло, отъ това трѣба да си е добила името и планината. На ю. отъ прохода билото на планината се повдига бавно, докль достигне върха *Велица* (1717. м.). Единъ мощенъ клонъ излиза отъ главното било на и. подъ името *Арабъ-чалъ*, послѣ завива на с.-и. и подъ името *Алабакъ* стрѣмно спира надъ Пловдивското поле. Той речн изцѣло е покритъ съ борова гора, която отъ години вече се сѣче и свлича къмъ тракийската желѣзница; затова на много мѣста гората е орѣдѣла. Къмъ Македония се спуща по-низъкъ, по-късъ клонъ, който полегато достига Места. Южно отъ върха Велица главното било продължава изпърво ю.-и. разлато и тѣпо съ една височина отъ 1500 до 1600 м. Всичко е обрасло съ ели и борове. Колкото повече се слиза на ю.-и., билото става по-широко, раздѣля се на три успоредни гребена и захваща широко пространство. Посрѣдата захваща главниятъ вододѣленъ гребенъ. На с. отъ него се издига колосална планина съ върха *Сютя*, много по-високъ отъ вододѣлното било (2183 м.). А отъ з. продължава другъ доспатски гребенъ около 1500 м. високъ. Между Тракийския гребенъ и главното било се образува дълбока гориста и тѣсна долина, успоредна съ веригата; въ нея се събира р. *Домузъ-дере*, важенъ притокъ на Кръчимъ. Между македонския гребенъ и главното било се образува трѣвнато плитко корито, продължено по посока на главната верига. И тукъ по

мочурливото дъно на доспатското корито тече подобна рѣка, която се именува *Доспатъ-дере*. Главниятъ срѣденъ вододѣленъ гребенъ образува въ сжщо врѣме българско-турската граница. Главниятъ, погранични гребенъ почва да се повишава, но пакъ нийдѣ не надминува горската растителностъ. Така той достига до върха *Янък-тепе* (1791 м.), отъ дѣто завива къмъ ю. и продължава съ една срѣдна височина около 1700 м., докѣ достигне върха *Каинъ-чалъ* (1807 м.), лежащъ на най-южната българска родопска граница. Тоя връхъ прѣдставя планински възелъ, отъ дѣто могатъ да се прослѣдѣтъ главнитѣ разклонения на Родопската планинска система: на с.-з. Доспатската планина, на и. срѣднитѣ Родопи и на ю. и ю.-и. южнитѣ Родопи. Отъ Каинъ-чалъ Доспатската верига се спуща право на ю. и достига Места, южно отъ устието на Доспатската рѣка, та образува една завършена верига отъ Самаръ дори до Чечкия, проломъ на Места, който тукъ се начева.

Коритестата поляна между двѣтѣ била на Доспатъ е обрасла съ трѣва и образува прѣкрасно планинско пасище, наречено *Доспатъ-яйлаж*, което достига ширина два километра на нѣкои мѣста, а въ южния си край се стѣснява и между двата успоредни гребена се образува тѣсна долина на Доспатската рѣка, гжсто населена съ помашки села. Прѣзъ Доспатската поляна минува вториятъ проходъ, който прѣсича планинската верига и съединява Неврокопската долина на Места съ Пловдивското поле. Проходътъ е високъ и мъчно-достъпенъ. Главниятъ пограниченъ гребенъ достига 1791 м. Отъ него се слиза въ Доспатската поляна, висока 1198 м. и сетѣ се минува вториятъ гребенъ, високъ 1234 м.

Съвсѣмъ другъ видъ прѣдставятъ Тракийскитѣ склонове на Доспатъ. Тукъ се развиватъ дълги клонове, високи колкото главното вододѣлно било, а понѣйдѣ и по-високи отъ него и на много мѣста покрити прѣимуществено съ борови гори по височинитѣ, съ букъ и джбъ по ребрата. Тѣ обикновено държатъ посока противоположна на македонскитѣ склонове и изглеждатъ като отдѣлно напрѣчени вериги, наредени отъ Места до Пловдивското поле. Низкото вододѣлно било се губи край високитѣ клонове, та не може да се види и отъ тракийска страна, както се не вижда и отъ македонска. Успоредно съ Арабъ-чалъ и Алабакъ се отдѣля отъ върха Сюткя голѣмъ клонъ, който се продължава на з. отъ Батакъ и Пещера и достига Пловдивското поле подъ *Каркария* планина (1484 м.) съ стръмни спускове срѣщу Пазарджикъ. Ребрата на тоя Доспатски клонъ сж покрити съ гори и отъ тѣхъ се отдѣлятъ множество

второстепенни клонове, та се посрѣщатъ отъ с.-западна страна съ разклоненията на Алабакъ. Между тия двѣ планини се намира коритото на многоводния Марицинъ притокъ *Елм-дере* съ разкошната *Чепинска* котловина, богата както Разлогъ съ минерални води и планински прѣлести. Още по-на с.-и. отъ Доспатския високъ гребенъ се отдѣля Баташкиятъ *Карлъкъ* (2078. м.), сѣщо по-високъ отъ главната верига, и отъ него се спущатъ височини на с. и с.-и. до равнината. Между Сютка и Баташкия карлъкъ започва *Баташката* рѣка, по която върви баташкиятъ пѣтъ отъ Пловдивъ за Неврокопъ. Сѣверозападно отъ Батакъ е обширна котловина, заградена отъ хубави борови гори. Дългнестото мочурливо нейно дѣно е извѣстно подъ името *Баташко блато*, което отъ врѣме до врѣме се пълни съ вода и се простира отъ ю. къмъ с. два часа надлъжъ и около половинъ часъ наширь. Височината на туй блато е около 1097 метра.¹⁾

Прѣзъ живописно планинско ждрело неговитѣ води се изливатъ на с.-и. въ Чепинското корито.

Източни Родопи.

Отъ върха *Кайнъ-чалъ* на и. се развива високата *Круша* планина, която съ гребена си надминува горската растителностъ. Тя е поставена въ центра на сѣщнскитѣ Родопи, като най-висока тѣхна часть. По несигурни измѣрения се прѣдполага, че достига 2300 м. Отъ широкото било на Круша с.-източно и послѣ източно между княжество България и Одринския вилаетъ продължава дълга планинска верига, извѣстна подъ името *Източни Родопи*, която достига близу до Марица при Мустафа-паша. Отъ жгъла между Доспатъ и източнитѣ Родопи излиза дългото планинско мѣчно достѣпно корито на р. Кръчимъ, гѣсто населено съ помаци и познато подъ името *Тѣмръшиъ*.

На с.-и. отъ Круша се простира главната източно-родопска верига съ срѣдна височина 1800 м. и съ отдѣлни върхове до 2000 м., която отдѣля Одринското корито отъ Пловдивското поле, като раздѣля въ сѣщо врѣме Тракия на двѣ голѣми половини, Пловдивска и Одринска.

Билото на веригата служи за граница между княжество България и Турция. Веригата на източнитѣ Родопи отъ срѣдата си нататѣкъ държи източна посока и достига долна Марица подъ

¹⁾ Иречекъ, Княжество България I. 465.

Мустафа-паша. Надлъжъ по тая Родопска верига се срѣщатъ слѣднитѣ по-главни погранични върхове: *Чепеларски Карлъкъ* (2183 м.), *Караманджа* (1884 м.), *Букова планина*, *Калъчъ-бурунъ*, *Св. Духъ* (1870 м.), *Муржовъ пожаръ*, *Чилъ-тепе* (1998 м.), *Ени-Ханъ-баба* (1945 м.), *Кара-Коласъ* (1797 м.), *Аква-тепе* (1575 м.), *Кокезъ-тепе* (1535 м.). Отъ вътрѣшнитѣ върхове по-забѣлжителни сж: *Тъмръшъ-модеръ* (1963 м.), *Персенкъ-тепе* (2051·8), *Ташъ-чукуръ* (1913·7), *Кара-балканъ* (1913 м.), *Гюндюзница* (1497 м.), *Бешу-лакъ* (1637 м.), *Синиръ-тепе* (1576 м.), *Пропулъ* (1556 м.), *Сиври-тепе* (1073 м.), *Саръташъ*, *Шилденски камъкъ* (1342 м.), *Св. Илия* (1423 м.), *Купена* (705 м.), *Айда* (925 м.), *Старъ-бунаръ* (1514 м.), *Червена стѣна* (1470 м.), *Драгойна* (812 м.) и др.

Сѣвернитѣ разклонения на източнитѣ Родопи се снишаватъ постепенно и въ видъ на хълмове достигатъ Марица. Малки при-тоци текатъ отъ тѣхъ къмъ Пловдивското поле и богато напояватъ тия плодородни мѣстности.

Между тия Родопи и тѣхния Тъмръшки клонъ, който върви право на сѣверъ, се намира дълбокото и живописно корито на Чепеларската рѣка, населено съ българско и помашко население и извѣстно подъ името *Рупчосъ*. Пространството между най-източния край на източнитѣ Родопи обхваща Хасковското хълмодоліе, страна много плодородна, дѣто се ражда тютюнъ, памукъ, сусамъ и пр.

Южнитѣ склонове на източнитѣ Родопи се снишаватъ къмъ голѣмото корито на Арда.

ЮЖНИ РОДОПИ.

Отъ Круша планина на ю. се спуска широко тѣпо трѣвнато било, наречено въ срѣдата *Олу-айлъкъ*, а въ южния си край — *Кушларъ-дагъ* (2177 м.). Това било отдѣля коритото на Арда отъ коритото на Места и образува природна граница на Македония. Отъ Кушларъ-дагъ къмъ и. се начева голѣмата южно-родопска верига, която опира до долното течение на Марица съ хълмисти крайща. Множество клонове отъ тая планина се спущатъ къмъ Арда и низки бърда врьстосватъ по разни посоки коритото на тая най-голѣма родопска рѣка. Коритото на Арда прѣдстави голѣма бърдиста и хълмиста котловина между източнитѣ и южни Родопи, въ която всѣки кѣтъ е така гжсто населенъ, както нийдѣ другагѣ въ полуострова. Най-западниятъ брѣгъ на това корито се нарича *Алж-челеби*, източниятъ се нарича *Кърджали*, а другъ единъ юженъ край е извѣстенъ съ името *Султанъ-ери*.

Южно-родопската верига съ западнитѣ си краища опира до Места и срѣща разклоненията на Бозь-дагъ. Двѣтѣ планински вериги сж раздѣлени отъ рѣката, която си е пробила планинско дълго мъчно достъпно ждрѣло. Южниятъ край на Места образува граница между Македония и Тракия. Южнитѣ Родопи, както и източнитѣ, сж по-малко гористи отъ Доспатъ. Всждѣ речи по върховетѣ имъ е запазена борова гора, а по ребрата по-често се срѣщатъ букови и дъбови гори. Много отъ достъпнитѣ краища на планинитѣ сж съвсѣмъ оголени.

II.

Споредъ д-ра Н. Dingler¹⁾ растителността на Родопитѣ се дѣли на два главни пояса. Докѣ южната имъ частъ има голѣма аналогия съ планинитѣ отъ срѣдноморския поясъ, сѣверната имъ верига, която ограничава горното корито на Марица, приближава се повече къмъ южнитѣ Карпати и Алптитѣ.²⁾ Единъ прѣходенъ поясъ, който има свои характерни чѣрти, образува между двата главни пояса Ардината долина съ редъ разклонения, които хълмисто чезнатъ чакъ до Одринъ. Другъ пакъ прѣходенъ поясъ съставя долината на Марица въ по-низкитѣ нейни течения.

Растителността на южнитѣ Родопи се отличава значително отъ срѣдно-европейската: първо тя има характеръ на срѣдноморската растителностъ и второ обнима нѣкои видове, свойствени на Гърция и Анадоля. Зимата тукъ изобщо не е тъй люта и повече прилича на студено дъждовно врѣме, макаръ че не липсува снѣгъ и мразъ. Ето защо по-голѣмата частъ отъ растителността запазва шумата си прѣзъ зимнитѣ мѣсеци. Тукъ вирѣятъ непадолистни дървета както: *Quercus Ilex* L., *Q. coccifera* L., послѣ *Phillyrea media* L., *Arbutus Unedo* L., *A. Andrachne* L., *Cistus salvifolius* L., и *C. creticus* L., *Erica arborea* L., *Juniperus Oxycedrus* L. и др. Всички тия растения сж храсти, високи близу човѣшки растъ, размѣсени съ други падолистни храсти както: *Pistacia Terebinthus* L., *Ostrya*, *Jasminum fruticans* L., *Genista juncea* L., *Paliurus aculeatus* Lm., *Pyrus salicifolia* S. S., *Crataegus orientalis* Pall., нѣколко

¹⁾ Вж. статията му *Das Rhodopegebirge und seine Vegetation* въ *Zeitschrift des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins*, Jahrg. 1877. II. München.

²⁾ Сродството на Родопитѣ съ Карпатитѣ става още по-явно, като се вземе прѣдъ видъ, че прѣди нѣколко години покойниятъ Ст. Георгиевъ намѣри въ алпийския поясъ на Сунгурин чалъ въ Костенецкая балканъ алпийската зора (*Rhododendron Mirtifolium* Schott et Kotschy), което растение е свойствено на Алптитѣ и Карпатитѣ и по-рано не бѣ намѣрено нигдѣ на Балканския полуостровъ.

вида джбъ сродни съ срѣдноевропейскитѣ и др. Тукъ-тамъ изъ този храстакъ се забѣлѣзватъ нѣкои витливи растения: *Smilax*, *Clematis Flammula* L., и *C. Viticella* L., *Lonicera etrusca* Sav. и *L. implexa* Ait. и др. Тая растителностъ покрива надлъжъ и ширъ низкитѣ склонове и хълмове на южнитѣ Родопи. Тамъ, дѣто тя е съставена отъ растения съ тъмнозелени лѣскави листа, дѣто напр. прѣобладаватъ *Phillirea* и *Arbutus*, пейзажътъ добива особна очарователностъ; но тамъ, дѣто прѣобладаватъ непадолистнитѣ, както напр. *Quercus Toza* Bosc. и др., картината приема сиво-зеленъ сивъ точъ, който хармонира съ срѣдноморскитѣ пейзажи и образува чудесенъ контрастъ на тъмната синева на безоблачното небо (Dingler).

Бато характерни, ако и не тѣй разпространени, за топлия източень поясъ на Родопитѣ трѣба да отбѣлѣжимъ *Quercus Aegijors* L., който тукъ-тамъ образува разрѣдени гори и поради плода си (*пагамудъ*) има голѣмо значение за населението. Намѣстѣ се срѣща, макаръ рѣдко, прѣкрасната *Sorbus trilobata* съ едри бѣло-снѣжни кичори. *Pinus maritima* Pall. покрива низкитѣ разклонения на планината, ограничавайки най-долната частъ на долината на Марица, именно скалиститѣ трахитни бърда между Фереджиѣ и Дедеагачъ. По скалиститѣ върхове, както напр. по мермернитѣ скали по западния склонъ на Гюмюрджинския карлъѣ, расте *Juniperus aegaea* Grsb.

Досущъ друга е растителността, що вирѣе въ рѣчнитѣ долини върху пѣсчана и алувиална почва, дѣто коренитѣ намиратъ доста влага. Тукъ срѣщаме стари платани, върби и тополи, които по долинитѣ на рѣкитѣ достигатъ близу до 800—900 м. надъ морето. По сжитѣ мѣста растятъ: *Vitex agnus castus* L., *Cynanchum acutum* L., *Periploca graeca*-L. и др. Рано пролѣтъ по незалѣсенитѣ трѣвисти мѣста тукъ се развиватъ всевъзможни видове луковични, пеперудоцвѣтни, слождоцвѣтни, каранфилови и др., ала щомъ слѣнцето почне по-силно да пече, всичко изсъхва и изгаря, па се обръща въ сиво-желта маса.

При изкачванъето по южнитѣ склонове на южната Родопска верига забѣлѣзваме, че непадолистнитѣ растения постепенно чезнатъ; нѣкои достигатъ височина около 500 м. надъ морската равнина: ала има и такива, които дохаждатъ до 800 м. По тия мѣста по лѣсоветѣ прѣобладава джбъ до 900 м. приблизително, а по-горѣ букъ и пасища, изкуствено създадени чрѣзъ пожари.

По сѣвернитѣ склонове на южната Родопска верига сж развити сжитѣ поясъ, само че отдѣлнитѣ видове слизатъ още по-ниско.

Тѣй напр. букътъ слиза до 700 м. При това тукъ липсува поясътъ на непадолистнитѣ. Срѣщаме гъсти и буйни джбови и букови гори, дѣто вирѣятъ разни билки, както *Geranium macrorhizum* L., *Ranunculus illyricus* L., *Thalictrum*, *Coridalts*, напрати, *Doronicum* и пр. Въ усойнитѣ влажни урви намираме *Lathraea rhodopaea* Ding., чиито сродни видове се намиратъ не въ Европа, а въ Япония. Горната граница на високостеблената гора въ южнитѣ Родопи прѣдстави букътъ. Застѣпени сж наистина и иглолистнитѣ, ала тѣ растятъ по усойнитѣ влажни сѣверни присои на южно-Родопскитѣ височини между 1500—1860 м. приблизително. Въ источната имъ часть ги нѣма. Смърчътъ липсува въ южнитѣ Родопи. *Juniperus communis* L. се явява намѣстѣ въ горната половина на пояса на листнатитѣ лѣсове, като замѣстя *J. Oxycedrus* L., който чезне на височина близу 1000 м., макаръ тукъ-тамъ да достига и до 1800 м. Въ южнитѣ Родопи липсува и сѣщинскитѣ алпийски поясъ. Само тукъ-тамъ, и то твърдѣ рѣдко се срѣщатъ ливади, подобни на алпийски, надъ 1800 м. Въ тия Родопи покрай другитѣ билки срѣщатъ се още: *Iris*, *Ornithogalum chloranthum* Saut., разни видове *Hieracium*, *Vaccinium* *Myrtillus* L., *V. vitis idaea* L. и пр.

Растителността на сѣвернитѣ Родопи (долината на Марица до Бѣльово) носи характеръ на южно-карпатска флора. Тя прилича на срѣдноевропейската, ала има особни свои форми. Поясътъ на листнатитѣ лѣсове почва отъ политѣ и се дѣли на два по-малки пояса: доленъ, джбовъ и горенъ, буковъ. Въ пояса на джба, който се простира най-много въ подножието на планината, се срѣщатъ нѣкои форми отъ топлия поясъ, както: *Paliurus aculeatus* Lm., *Salvia Sclarea* L. и др.; а въ лѣсоветѣ освѣнъ джбъ растятъ: клечатъ габъръ (*Carpinus duinensis* Scr.), кленъ (*Acer campestre* L.), яворъ (*Acer Pseudo-Platanus* L.), брѣстъ (*Ulmus campestris* Sm.), лѣска (*Coryllus Avellana* L.), *Cornus mas* L. и *C. sanguinea* L., *Alnus glutinosa* G., *Tilia argentea* Dsf., тукъ-тамъ букъ и др. Въ този поясъ срѣщаме още разни видове *Primula*, *Anemone*, *Isopyrum thalictroides* L., *Viola*, *Erythronium*, *Corydalis*, *Lunaria biennis* Mch., *Chrisosplenium oppositifolium* L., *Ch. alternifolium* L., *Asarum europaeum* L., *Telekia speciosa* Bmg., *Calystegia sylvatica* Chois., *Möhringia pendula* W. K. и пр. Изобщо поясътъ на джба е много по-тѣсенъ отъ пояса на бука, който иде слѣдъ него. Въ тоя подирния поясъ освѣнъ букъ срѣщаме трепетлика (*Populus tremula* L.), брѣза (*Betula alba* L.), дива оскруша (*Sorbus aucuparia* L.) и липитѣ *Tilia argentea* Dsf. и *T. parviflora* Ehr., които особно сж харак-

терни за пояса. Забѣлѣзватъ се и отдѣлни дървета отъ иглолистнитѣ, които въ известни точки слизатъ въ хладнитѣ сѣнчести долини до 500 м. На много мѣста *Pinus Laricio* Poir. и *P. sylvestris* L. се срѣщатъ въ изобилие размѣсени между широколистнитѣ, особно съ бука. Отъ билкитѣ растятъ: *Epiractis latifolia* All., *Stellaria nemorum* L. *Epilobium montanum* L., *Lactuca muralis* L., *Astrantia major* L. *Asperula odorata* L. и пр.

Изобщо поясътъ на листнатитѣ лѣсове достига сръдно до 1300 м. височина, ко тукъ-тамъ размѣсенъ съ иглолистнитѣ (смърчъ, ела) засѣга и по-голѣми височини. Доклѣ на едни мѣста лиственитѣ гори спиратъ до 1100 м., на други буквитѣ лѣсове достигатъ до 1600 м. По-долу отъ 1000 м. букътъ образува обширни гори, като изтиква постепенно смърча.

Поясътъ на иглолистнитѣ по сѣвернитѣ Родопи е твърдѣ разпространенъ, повече вертикално. Той начева надъ бука и въ най-горнитѣ си части между 1300 и 1800 м. почва съ мурата (*Pinus peuce* Grsb.), която тукъ се намира въ осамотени екземплари, а въ рѣдки случаи образува и отдѣлни групи. Подъ мурата е застъпена бѣлата ела (*Abies pectinata* D. C.) и особно смърчътъ (*Picea excelsa* Link.), който образува най-хубавитѣ лѣсове по Родопитѣ. Освѣнъ тия иглолистни тукъ срѣщаме още *Pinus sylvestris* L., *P. Laricio* Poir., *Juniperus communis* L., *J. nana* Willd., *Alnus viridis* D. C., *Salix Caprea* L., *Sambucus racemosa* L. и *S. nigra* L., *Coryllus Avellana* L., *Rubus* и др. Явяватъ се още и нѣкои билки, характерни за високитѣ юго-източни европейски планини. По планинскитѣ ливади забѣлѣзваме разни видове *Ranunculus*, *Sedum*, *Digitalis*, *Geum coccineum* S., *Bruckenthalia spiculifolia* Rchb., *Jasione supina* Auct., *Dianthus microlepis* Boiss., *Silene clavata* Pč., *S. Roemerii* Friv., *Circaea Lutetiana* L., *Inula Hellenium* L., *Senecio nemorensis* L., *Impatiens noli tangere* L. и пр.

Надъ пояса на иглолистнитѣ почва алпийскиятъ поясъ. Въ статията си за растителността на Рила и Родопитѣ¹⁾ Георгиевъ раздѣля пояса на иглолистнитѣ на два по-малки пояса: 1) поясъ на червената ела или смърча и 2) поясъ на клековитѣ — вѣроятно затуй, че на много мѣста както червената ела, която расте по-низко отъ клека, тъй и клектъ образуватъ самостоятелно обширни непроходими лѣсове. Dingler²⁾ обаче не прави подобно под-

¹⁾ Вж. Мѣб. IV, 541.

²⁾ Das Rhodopegebirge и пр., 219.

раздѣление, а отъ пояса на иглолистнитѣ минува направо въ алпийския поясъ, къмъ който отнася и *Pinus montana* Duroi., що започва тукъ-тамъ отъ 1700 м. и далечъ надминува границата на иглолистния поясъ. Чини ми се, че въ случая Георгиевъ е по-правъ, защото сщинскиятъ алпийски поясъ започва надъ 2000 метра. Обаче и тукъ, както и у другитѣ пояси не сществува рѣзка граница. Много растения, които смѣтаме характерни за единъ поясъ, срѣщаме ги и въ съседния нему, и обратно. Твърдѣ често пъкъ, особно въ долинитѣ, смѣшението на видоветѣ е таково, че е трудно да се каже, къмъ кой именно поясъ принадлежи растителността на дадена мѣстность.

Въ алпийския поясъ по Dingler'a срѣщаме *Cerastium*, *Arenaria*, *Gnaphalium dioicum* L., *Geum*, *Veronica*, *Myosotis*, *Soldanella*, *Saxifraga bryoides* L. и *S. cymosa* W. K., *Dianthus microlepis* Boiss., *Jasione supina* Auct., *Campanula alpina* L., *Primula minima* L., *Iuncus trifidus* L., разни низкорасли трѣви, както и нѣкои лишай и мъхове, които достигатъ дори до снѣговетѣ.

Низкитѣ гребени, които образуватъ сръдногорието на Ардината долина, както и гориститѣ разклонения източно отъ нея съставятъ прѣходъ между низкия широколиственъ поясъ на южната верига и низкия широколиственъ поясъ на сѣверната верига. Хълмоветѣ тукъ сж покрити съ джбъ и храсти. Растителността изцѣло се приближава къмъ топлата областъ на Марицината долина. Между джбовия храстакъ се забѣлѣзва *Phillyrea*, *Fraxinus* *Ornus* L., *Fagus sylvatica* L., *Sorbus torminalis* L., *Acer Tataricum* L., видъ твърдѣ разпространенъ въ долината на Марица и съставлящъ единъ видъ съединителна черта между растителността на тоя край и на степната полска областъ. Отъ билкитѣ тукъ се срѣщатъ: *Raeonia decoa* And., *Ajuga Laxmanni* Bth., *A. salicifolia* L., нѣколко вида *Orobus*, разни видове *Helianthemum*, *Potentilla*, *Astragalus* и др. Ала най-вече е характерно *Hypericum rhodoplum* Friv. Низкитѣ хълмове сж покрити главно съ джбъ, *Paliurus*, *Acer Tataricum* L. и многобройни едногодишни билки.

Безъ съмнѣние горнитѣ кратки бѣлѣжки не сж доста да си съставимъ пълно понятие за пояситѣ на Родопската растителность. За това сж необходими още многобройни материяли и обиколки, за да може да се проучи както трѣба растителността на тия сложни планини по ясно охарактеризувани пояси.

III.

Прѣзъ първитѣ дни на юлия, придружени отъ вѣщъ познавачъ на мѣстността, г. д-ръ Г. Бончевъ, съ когото пътувахъ 15 дена, и азъ напуснахме Станимака, отъ дѣто слѣдъ нѣколко часа пжть по течението на Бачковската рѣка рано прѣди обѣдъ пристигнахме въ Бачковския манастиръ. Пжтьтъ отъ Станимака води по скалистия западенъ брѣгъ на рѣката, завива край историческата Асѣнова крѣпость, взима южна посока и се вмѣква въ мжчно достѣпна планинска тѣснина. Изпърво той върви между богати лози, слѣдъ което постепенно се качва и става все по-стрѣменъ и по-стрѣменъ, доклѣ се прѣвали височината и дойде до гиздава полянка *Рунски ханове*¹⁾, токо задъ каменистия мостъ на планинския потокъ Луковица. Отъ тукъ лозята, а слѣдъ тѣхъ и нивитѣ юмай съвсѣмъ орѣдѣватъ, като отстѣпятъ лека полека мѣсто на дивата природа. Пжтьтъ отново слиза и се качва, минува по източнитѣ поли на върха Баба (1039 м.), оставя надѣсно с. Бачково, прилѣпено възъ дѣсниа брѣгъ на рѣката, и бързо се спуща къмъ рѣчното корито, за да ни изведе до самия Бачковски манастиръ (около 353 м. надъ м. р.),²⁾ разположенъ въ разкошна планинска котловина, окръжена отъ стрѣмни залѣсени планини. Както изобищо всички родопски долини, тѣй и тая се отличава по своитѣ природни хубости. Буйна и богата растителность покрива тукъ стрѣмнитѣ и недостѣпни дори планински склонове и тераси. Вредъ по околнитѣ височини се зеленѣятъ джбови, букови, а тукъ тамъ и борови гори, а долу край рѣката, покрай многобройнитѣ и разнокитни билки, както *Medicago rhodopea* Vel., *Sonchus uliginosus* M. B., *Reseda inodora* Rchb. *Cerastium rectum* Friv. *Geranium molle* L. и пр., вирѣятъ още *Platanus orientalis* L., *Alnus*, *Acer*, *Juglans regia* L., *Carpinus*, *Populus*, *Paliurus*, тукъ-тамъ *Juniperus Oxycedrus* и др. По източнитѣ склонове на Баба, както и около самия манастиръ срѣщаме: *Fraxinus Ornus* L., *Ulmus*, *Acer*, *Quercus*, *Rhus* и др. Вжтрѣ въ манастирския дворъ расте *Diospyros lotus* L. (джинджифаръ), чиято височина не е по-малка отъ 20—25 метра. Другъ единъ екземпляръ отъ сѣщия видъ вирѣе извънъ манастирската ограда. Вѣроятно туй дърво ще да е прѣнесено отъ Атонъ.

Слѣдъ кратка почивка въ манастира трѣгнахме за с. Югово. Пжтьтъ отъ манастира до това село върви сѣщо речи успоредно

¹⁾ Имената, които сж наредени съ курсивъ, не фигуриратъ въ картата на руския генераленъ щабъ, нито въ друга нѣкоя карта.

²⁾ Всички височини, които даваме тукъ, а липсватъ въ картата, сж приблизителни.

съ рѣката и изпърво държи ю.-з. посока. Намѣстѣ той е твърдѣ стръменѣ. Речи на половината му се намира мѣстността *Сливово дере*, съ едноименѣ планински притокѣ на Бачковската рѣка. Тукѣ *Nimulus* покрива цѣли пространства. Не по-малко е и дивата лоза, комай всждѣ придружена отѣ *Clematis*. Бугетѣ се срѣща по цѣлия пѣть надѣ 400 м., но още прѣснато, както и *Juniperus*. Къмѣ Югово прѣобладаватѣ *Tilia*, *Quercus* и доста *Fraxinus*. По пѣтя, по изложенитѣ на припекѣ мѣста, намѣрихѣ и новия видѣ на Веленовски *Anthemis gaudium solis* Vel., откритѣ за прѣвъ пѣть отѣ Стрибърни прѣвъ 1897. въ околноститѣ на Скобелево. Подирѣ *Сливово дере* слѣдва мѣстността *Дълга усойка*, а подирѣ нея и мѣстността *Дѣтѣ черкаи*; тукѣ има малка селска постройка, наречена *Дѣтѣ хамчета*. Слѣдѣ туй пѣтьтѣ постоянно се качва, минува прѣвъ мѣстността *Душковецѣ* и *Плешивецѣ*, за да влѣе прѣвъ юговскитѣ лозя въ Югово, разположено приблизително 670 м. надѣ м. рав. Около селото се издигатѣ вървоетѣ *Лазудово* на с.-и., *Вълаѣчовица* и *Божейми* на ю.-з. и *Кѣлки* на ю.-ю.-з. Изгледѣтъ отѣ тукѣ е прѣкрасенѣ. Особно живописна панорама се открива на ю., дѣто ясно се виждатѣ очертанията на мощнитѣ Родопски масиви, отѣ които нѣкои покрити съ гѣсти букови и иглолистни гори. Освѣнѣ другитѣ растения въ околноститѣ на Югово расте и новиятъ видѣ на Веленовски *Achillea Vandasii* Vel., заедно съ *A. odorata* Koch. и др.

Споредѣ прѣдначертания си пѣть рано заранѣта на другия день, прѣдвождами отѣ опитни водачи, трѣгнахме за Павелско. Пѣтьтѣ, що избрахме за това село, е единѣ отѣ най-мѣчнитѣ. Изобщо той има ю.-з. посока. Слѣдѣ петѣ часа моренѣ ходѣ стигнахме до мѣстността наречена *Анатемитѣ* (около 1200 м.), чинто поли сѣ обрасли въ растителностѣ. Отѣ разнитѣ широколистни дървета тукѣ се срѣщатѣ: *Crataegus*, *Prunus spinosa* L., *Syringa vulgaris* L., въ изобилие, *Rhus*, *Fraxinus* *Ornus* L., *Quercus*, *Fagus Silvatica* и разни храсте. Всички тия дървета достигатѣ до 800 м. височина надѣ м. р., надѣ която започва *Pinus*, що покрива цѣли пространства по широкото било на планината. По политѣ на *Анатемитѣ* тукѣ-тамѣ растѣтъ: *Digitalis laevigata* W. K., *Marrubium Frivaldskyanum* Boiss., *Onobrychis alba* W. K., *Campanula persicifolia* L. var. *Sessiliflora* C. K., *Pyrethrum corymbosum* W. (L.) и др. Отѣ *Анатемитѣ* пѣтеката взима западна посока, а на много мѣста дори липсватѣ и слѣди отѣ нея. Започва се бързо слизанѣ

надолу. Тукъ сме въ страховитата мѣстность *Люти долъ*,¹⁾ чиято най-низка частъ стои близу 800 м. надъ м. равнище. Гжстъ, вомай непроходимъ буковъ лѣсъ покрива стръмнитѣ и недостъпни планински спускове. Почвата подъ възѣтъ се рони и забава вървежа. На много мѣста бѣхме принудени да се влачимъ сѣдешкомъ. Дори и мулетата запрѣха. Най-послѣ стигнахме въ тѣсното мочурливо дѣно, за да поемемъ отсрѣщната височина — ю.-източния склонъ на върха *Гѡра*, високъ близу 1140 м. Отъ този върхъ гледѣта е чудесна. На западъ и ю. се очертава въ далечината по-голѣмата частъ на Чепеларската котловина; на с.-западъ живописната Бѣла черква, а на ю.-з. задъ Чепеларската котловина се синѣятъ върховетѣ на Персенкъ, Пилафъ-тепе и редъ още други височини на хоризонта. Отъ върха *Гѡра* се наваля прѣзъ височината *Кѣлки*, слиза се въ мѣстността *Блатѡта*, дѣто сж Павелскитѣ лозя и се стига въ с. Павелско (670 м.). Понеже врѣмето продължаваше да е добро, рѣшихме, слѣдъ малка почивка, да заминемъ за с. Дрѣново. Отъ тукъ пѣтътъ ни взе ю.-из. посока. Щомъ излѣзохме отъ село, прѣдъ насъ се изпрѣчи гола, камениста стръмнина, по която трѣбаше да се качваме на първо врѣме. По-нагорѣ пѣтътъ става сравнително по-веселъ, ако и да е все тѣй мжченъ. Качваме се по с.-западнитѣ склонове на върха *Бешулакъ* (1637 м.) и едно по друго прѣминаваме гиздавитѣ планински полянки: *Ильовъ гробъ*, *Конско плѡднице* и *Мѡрчевица*, висока 1500 м. Подирѣ туй възлизаме на самия върхъ нареченъ *Тузлата*, прѣдставяща широко планинско плоскогорие, обрасло съ буйна трѣва и тукъ-тамъ прошарено съ локви и мочури. Отъ тукъ особно ясно се виждатъ бѣлоснѣжнитѣ върхове и сѣверни склонове на ю.-западнитѣ и южни Родопски височини, съставлящи турско-българската погранична линия. По-главни отъ тия височини сж върховетѣ: *Кара-балканъ* (1913 м.), *Кѡрлѣкъ* (2183 м.), *Караманджа* (1884 м.), *Св. Духъ* (1870 м.), и др. Отъ *Тузлата* се спущаме по ю.-източнитѣ склонове на *Бешулакъ* и минаваме прѣзъ хубавата мѣстность *Пашалийска гора*,¹⁾ състоеща речи изключително отъ вѣковни буки. Отъ тукъ слизаме вече все надолу, като оставяме задъ себе си мѣстноститѣ: *Лѡквата*, *Сѣдуля*, *Циганецъ*, *Голѣмитѣ ливади* и *Крийща*, дѣто е издигната чешма съ бистра обилна вода. Всички тия мѣстности сж важи

¹⁾ Анатемитѣ сж водоѣмната линия между Юговско и Люти долъ.

¹⁾ Нѣколко дѣна прѣди нашето заминаване отъ тукъ грѣмотевица поразила на това мѣсто 120 овни заедно съ двамината овчари. Сега надъ погрозилитѣ букови скелети се виеха съ стотни орли, за да довършатъ послѣднитѣ остатѣци отъ обилния лешъ.

лишени отъ листнати и иглолистни дървета, вмѣсто които се простиратъ тлѣсти обширни паша и ливади. Отъ чешмата до с. Дръново разстоянието е твърдѣ кратко. Слѣдъ малъкъ завой прѣзъ утънала въ зеленина долинка се възлиза на каменистия хълмъ *Св. Георги*, върху чийто източенъ склонъ е разположено село Дръново (980 м.), дѣто слѣдъ 17 часа пѣтъ, заедно съ спирањето да събираме материали, стигнахме късно вечерьта. Отъ иглолистнитѣ по Бешулакъ растѣтъ главно *Pinus Laricio* Poir. и *Picea exelsa* Lnk. Тукъ вирѣятъ и слѣднитѣ интересни видове, отъ които нѣкои нови за Родопитѣ: *Hypericum hirsutum* L., *Trifolium medium* L. subsp. *balkanicum* Vel., *Potentilla obscura* Lehm., *Telekia speciosa* Bmg., *Pastinaca hirsuta* Panč., *Astrantia major* L., *Gymnadenia conopsea* Br., *Centaurea maculosa* Lam. и *Cynosurus cristatus* L. Тукъ намѣрихъ и *Dianthus turcicus* Vel., събрано прѣвъ пѣтъ отъ Стрибърни въ околноститѣ на Станимака прѣзъ 1891. год.

По живописенъ планински пѣтъ се спуснахме зараньта рано отъ Дръново въ източна посока по *Дръновското дере*, за да прѣкосаме слѣдъ малко Джурковското дере, поено отъ бистъръ планински потокъ, който извира отъ политѣ на върха Момина-вода, взима с. посока, приема водитѣ на Лѣкавската, Бѣлицката, Еръкюприйсвата и др. още рѣки и потоци, и като Юговска рѣка се влива подъ Югово въ Бачковската рѣка. По склоноветѣ отъ двѣтѣ страни на *Дръновската*, както и на Джурковската рѣка има въ изобилие *Coryllus Avellana* L., *Carpinus Betulus* L., лилякъ, стари дрънове и разни други още листнати дървеса. Тукъ растѣтъ още *Jnula Aschersoniana* Jka, *Erithraea Centaurium* Pers., *Haberlea rhodopensis* Friv, въ пукнатинитѣ на скалитѣ, *Galium rubioides* L. *Asperula flacida* Ten., *Verbascum Bornmülleri* Vel. и др.

Пѣтеката, що води отъ Джурковското дере за Лѣкавица, е неимовѣрно стрѣмна. Слѣдъ морно катеренъе прѣзъ повече отъ три часа низъ хубава джбова и букова гора възлѣзохме на върха *Прѣстѣченъ* или *Чуката*, високъ около 1130 м. Този върхъ се намира на с.-и. отъ Дръново и прѣдстави малко широко равнище. На туй мѣсто има нѣколко помашки колиби отъ с. Лѣкавица. Отъ тукъ ясно се вижда коритото на Лѣкавската рѣка, надъ която се възвишаватъ голи непристѣпни скали, а задъ тѣхъ на с.-и. ясно се откроява на хоризонта върхътъ Проуль (1556 м.) Слѣдъ туй взехме ю.-и. посока по сѣвернитѣ поли на високия върхъ ю.-з. отъ с. Лѣкавица, нареченъ *Карниде* и въ единъ часѣтъ слѣдъ обѣдъ стигнахме въ това доста голѣмо село. Слѣдъ кратка почивка, придру-

жени отъ единъ мѣстенъ помакъ, отидохме да споходимъ мѣстността *Синиръ-дере*, отстояща близу три километра и. отъ селото. Въ тая мѣстность се намира богата галенитна руда, измита отъ планинския потокъ, що свлича водитъ си отъ околнитъ височини *Синиръ-тепе* и *Сиори-тепе*, като приема отъ с. притока *Сокаръ-дере* откъмъ волибитъ *Топракъ-махале*. Тукъ се бавихме около два часа и пакъ поехме височината по западнитъ ѝ склонове прѣзъ мѣстността *Долна Кабица* въ южна посока. Кжсно вечерята, откакъ прѣминахме прѣзъ хубава гориста мѣстность, дѣто сжщо се задържахме дѣ повече дѣ по-малко, пристигнахме въ друго помашко село, *Крушово*, високо близу 1080 м. надъ м. р. Покрай другитъ растения въ Синиръ-дере, както и въ гората между Лжавица и Крушово срѣщатъ се рѣдки екземпляри *Campanula velutina* Vel., *Telekia speciosa* Bmg., *Polygala major* Jcq., *Gymnadenia conopea* Br., *Cystopteris Fragilis* Brnh., *Asplenium Germanicum* Weiss., *Sellaginella Helvetica* Sprng., *Tragopogon pratense* L., *Campanula percisifolia* L. и пр. Гората се състои повече отъ джбъ, габъръ, по височинитъ букъ, а тукъ-тамъ и осика (*Populus tremula* L.), въ съдружие съ разни други листнати дървета. Откъмъ югъ Крушово е забиколено отъ хубави борови и елови гори и се открива приятна гледа къмъ *Кенанъ-дере* и Сребро, дѣто има други галенитенъ рудникъ. Мѣстнитъ помади разказватъ, че прѣди врѣме край самото село имало обширни елови гори, ала сега отъ тѣхъ останалъ само единъ поменъ.

Понеже на другия день ни прѣдстоеше дългъ пътъ, рано заранята ние напуснахме Крушово и по козя пътека завихме с.-и. по политъ па върха *Синиръ-тепе*, високъ около 1576 м. и покритъ съ развошна растителность. По върха е застѣпена *Abies* и *Pinus*. Покрай другитъ растения тукъ не сж рѣдкость още *Vaccinium Myrtillus* L., *Lactuca muralis* Fres., *Spiraea Ulmaria* L. *Paris quadrifolia* L., *Centaurea maculosa* Lam.; по политъ *Trifolium campestre* Schreb. *Aspidium Filix mas.* Sw., *Scabiosa ochroleuca* L. c.) subsp. *rhodopea* Vel. и пр. Източно-юго-източно отъ този връхъ е върхътъ *Каръ-тепе*. Отъ Синиръ-тепе завиваме въ ю.-и. посока, минаваме по източнитъ склонове на Каръ-тепе и околнитъ височини, отъ дѣто се спускаме въ и. посока по едно стръмно гребенесто ребро, което се протака до върха Попазъ, лежещъ на с. отъ смѣсеното турско-помашко с. Карамъшъ (1010 м.), дѣто скоро и стигнахме. Тука вече сме речи на самата граница и ясно виждаме високото било на Ейри-тепе (1708 м.) отъ югъ, а сѣверно отъ него върха *Соколецъ*, послѣ

гребенътъ между Карамъшъ и Амбаръ-дере отъ и. и Аква-тепе (1575 м.) и *Гарванецъ* отъ с.-изтокъ.

Отъ тукъ по Бѣлишката рѣка, утънала въ зеленина, лѣщакъ, букъ, а по-рѣдко джбъ, лилякъ и др., продължихме пѣтя си за турското с. Бѣлица, на с.-з. отъ Карамъшъ. Отъ Бѣлица (650 м.) по мѣчна стрѣмна пѣтека се качихме на височината, извѣстна подъ името *Митиризитъ*, тъкмо на с. отъ селото, висока около 1300 м. Тая мѣстность е досущъ гола, покрита тукъ-тамъ съ дребна растителность. Малко на с.-з. отъ тукъ е турското село Борово, разположено въ подножието на планинския гребенъ, нареченъ Градище въ посока къмъ Югово между Бѣлишката и Еръ-къоприйската рѣка. По несигурна камениста пѣтека навалихме по с.-и. склонове на *Митиризитъ* и не слѣдъ много стигнахме въ селото Еръ-къоприя, разположено въ долината на Еръ-къоприйската рѣка. При всичко че околността тукъ е повече камениста, впечатлението е прѣкрасно. Особно живописна е гледката на ю.-ю.-и. отъ селото. Отъ тукъ се виждатъ височинитѣ Къзъ-кая, *Караджовъ камъкъ*, *Гарванецъ*, Кръстова и др. малки възвишения. Между Бѣлица и Еръ-къоприя намѣрихъ *Scabiosa ochroleuca* L., subsp. *rhodopea* Vel., *Jasione Heldreichii* Boiss., *Galium Schultesii* Vest. и др. Отъ листнатитѣ дървета прѣобладаватъ джбъ, букъ, а тукъ-тамъ и иглолистни. Понеже искахме да съберемъ още нѣкои и други материяли, не се бавихме въ селото, а тръгнахме за Тополово прѣзъ върха Шилденски камъкъ, чиито източни склонове, по които именно минахме, сж покрити речи изключително съ габеръ, а на много мѣста и съ *Pteris aquilina* L. Общиятъ изгледъ на растителността тукъ приблизително е сщиятъ, като по пѣтя отъ Бѣлица до Митиризитъ. Иглолистнитѣ сравнително сж слабо застъпени. Повече ги намираме по ю.-и. височини надъ Еръ-къоприя, дѣто не липсува и букъ. Върхътъ Шилденски камъкъ, високъ около 1342 м., има особенъ характеръ: въ най-горната си часть е съставенъ отъ голи островърхи назбени скали, покрити съ лишаи, а въ долната е облѣченъ съ гжста разноцвѣтна растителность. Крагзорътъ отъ тукъ е необятенъ. Далекъ прѣдъ окото на с.-и. се разстилатъ хълмиститѣ поли на Родопитѣ дори до Марица. На ю.-и. се възвишаватъ върховетѣ: *Дълга поляна*, *Тръна* и *Кокезъ-тепе* (около 1535 м.), свързанъ съ редъ други височини, по чието било се простира самата граница. Пѣтътъ отъ Шилденски камъкъ за Тополово върви право малко сѣверо-източно. Изпърво той е доста сложенъ и особно приятенъ, защото всичко наоколо е покрито съ най-разнообразна расти-

телностъ; ала щомъ оставишъ отдѣсно върхътъ *Костенецъ* и се спуснешъ надолу къмъ селото, растителността лека полека чезне, пътятъ незабѣлвано се обръща въ пѣтека, която отъ своя страна намѣстѣ съвсѣмъ се губи. Слизаме по невѣроятни стрѣмнини, покрити съ безбройни разпелѣни балвани и остри камѣни. На много мѣста дори и мулетата мъчно прѣстѣпнатъ. Кракътъ се лѣзга на всѣка крачка. Най-сетнѣ слѣдъ крайно морно спущанье въсно вечеръ стигнахме въ голѣмото село Тополово, разположено въ низкитѣ поли на Родопитѣ на височина не повече отъ около 500 м. надъ м. р. По височинитѣ надъ Тополово расте *Melica nutans* L., въ джбравитѣ *Pyrola secunda* L., *Calystegia sylvatica* Choix., рѣдкото за България растение *Sedum caespitosum* D. C. и др. Понеже мѣркахме да обиколимъ нѣкои части отъ сѣвернитѣ поли на Родопитѣ, слѣдъ еднодневна почивка въ Тополово заминахме прѣзъ Новаково за с. Караджиларъ. Пътътъ отъ Тополово—Тахталии за Новаково е сложенъ и има и.-ю.-и. посока. Той води прѣзъ добръ разработени плодородни мѣста, дѣто вирѣе и тютюнъ. Южно отъ пътя, по политѣ на Родопскитѣ прѣдгория, цѣли пространства сж покрити съ низка джбова гора (джбрава), дѣто растѣтъ още габъръ, маждранъ, липа, кленъ и особно много смрадлика, която покрива цѣли пространства, както напр. *Еланъ-тене* на с.-и. отъ Тополово. По височинитѣ надѣсно отъ пътя вирѣе букъ, а още по-горѣ започватъ пакъ иглолистни. Новаково е около 510 м. надъ м. рав. На ю.-и.-и. прѣзъ леглото на горното течение на р. Мечка, се издига върхътъ *Калето* (686 м.). Откакъ се побавихме въ околноститѣ на селото, потеглихме за Караджиларъ с.-и. отъ Новаково. И тукъ пътятъ е много добъръ и върви успоредно съ рѣка Мечка, която води началото си отъ върха *Дълга поляна* на ю. отъ Новаково. На ю.-и. отъ тоя пътъ е *Мажряковъ връхъ*, вѣроятно нареченъ тъй поради многото осинѣ или *мажрявка* (*Fraxinus*), както го тукъ наричатъ, що расте по него. Почти на половина пътъ отдѣсно е слабо хълмистата мѣстностъ *Ючъ-кютюкъ*. Край Мечка, както и по нейнитѣ притоци, растѣтъ въ изобилие елхи, върби и много други растения. Тукъ-тамъ се обработва памукъ и тютюнъ. Караджиларъ е голѣмо богато село, високо около 350 м. надъ м. рав. Околноститѣ му сж твърдѣ плодородни. Нарѣдко има мѣсто неразработено. Прѣзъ самото село тече *Черъшка*, която извира отъ гориститѣ поли на Саръташъ-дагъ южно отъ Караджиларъ. Слѣдъ като прибира водитѣ на многобройни по-малки рѣчици, *Черъшка* извира надолу по полето, забикаля височината Драгойна и околнитѣ ѝ хълмове, ми-

нува прѣзъ Кара-аланъ, Козлукъ, Дипсизъ-гьолъ, Бодрово и се влива въ Марица срѣщу селото Алтънъ-чаиръ (Чирпанско). По течението на тая рѣка се намиратъ многобройни мелници. Между Тополово и Караджиларъ вирѣятъ *Alnus*, маждринъ (*Fraxinus Ornus* L.), джбъ, габъръ, тукъ-тамъ *Populus alba* L. и др.

Лошото дъждовно врѣме ни задържа въ Караджиларъ повече; затуй щомъ се разведри веднага тръгнахме за пограничното българско село Сърнатъ (Хасков. околия) въ южнитъ поли на Айденскитъ възвишения, ю.-и. отъ Караджиларъ. Съ малки изключения пътятъ е сложенъ и минава прѣзъ живописна мѣстность. Височината, по която се качваме, сравнително е слаба. Изпърво минаваме прѣзъ мѣстността *Куру-чешме*, като оставяме отдѣсно нивкия върхъ *Орта-тене* на ю. отъ Караджиларъ; оставяме задъ себе си и *Мамдрата*, завиваме слѣдъ това въ подножието на върховетъ *Шафрана* и *Св. Илия*, за да стигнемъ най-послѣ върха *Кюмюрджи-тарла* (*Елз-гидикъ*), дѣто се намира нашиятъ пограниченъ войнишки постъ, отстояещъ недалечъ отъ турския. Височината тукъ е около 790 м. надъ м. р.

Отъ *Кюмюрджи-тарла* продължихме пътя си по самата граница, слѣзохме подиръ туй въ *Душка дере*, прѣсѣкохме го слѣдъ малко и поехме стрѣмната височина, по билото на която е пътятъ отъ Караджиларъ за Сърнатъ. По цѣлото протежение на билото прѣобладава дребенъ джбъ, тукъ-тамъ се явява букъ, повече се срѣща габъръ. Намѣстъ вирѣе и *Paliurus*'a, който достига до 600 метра височина надъ м. р. По-едри джбови дървета растятъ близу до с. Сърначъ (485 м.), разположено въ гола хълмиста мѣстность. Между разнитъ листнати дървета въ този край се срѣщатъ още *Acer platanoides* L., *Pyrus amigdaliformis* Vill., *Carpinus duinensis* Scop., *Fraxinus excelsior* L. и пр. Тукъ растятъ и нѣкои рѣдки видове, както *Centaurea Gheorgiefii* Halacsy, *Jasione Heldreichii* Boiss., *Scabiosa Silaifolia* Vel., *Asperula flaccida* Ten., *Galium Schultesii* Vest. *Patentilla obscura* Lehm., *Berteroa incana* D. C., *Dianthus giganteus* d'Urv., новиятъ видъ на Веленовски *Anthemis gaudium solis* Vel. и др. Въ туй село пристигнахме слѣдъ обѣдъ, съпроводжани отъ слабъ дъждецъ, който слѣдъ влизанъето почна да вали като извръжавъ и причини цѣло наводнение. На утрото отъ Сърначъ тръгнахме рано въ зори. Цѣлта ни бѣше вечерта да стигнемъ Хасковскитъ бани. Обаче вмѣсто да вървимъ по прѣкия пътъ, ние избрахме пътя прѣзъ *Узунъ-дере* въ надежда, че тукъ ще можемъ да съберемъ и повече и по-интересни материяли. *Узунъ-дере*, както

свѣдочи самото му име, е дълго рѣчно корито, което се простира съ малка извивка на з. до източнитѣ поли на Купѣна (705 м.) с.-з. отъ Сърнѣчъ, взима сѣверна посока и приближава Буково. Източно отъ това дере сж възвишенията Айда (925 м.) и други нѣкои по-низки безименни върхове, а западно, въ самото му начало, е Купѣна и други нѣкои възвишения сѣверно отъ него, които прѣсичатъ едникия по-дългъ западенъ притокъ на Узунъ-дере, *Душка-дере*, и съ сѣвернитѣ си поли достигатъ леглото на *Домуз-дере*, наречено въ източната си частъ *Глуханско-дере*. Върхътъ Айда цѣль е покритъ съ гжста гора, състоеща главно отъ джбъ и габъръ. Срѣща се сжщо много липа, а тукъ-тамъ и дива оскруша. Срѣдната височина на *Узунъ-дере* е около 350 м. Растителността му е твърдѣ разнообразна. Речи по цѣлото му протежение има хубава джбрава. Тукъ се забѣлѣзватъ *Nigella sativa* L., *Berteroa incana* D. C. *Lavatera thuringiaca* L., var. *bulgarica* Vel., *Polygonum lapathifolium* L., *Anchusa officinalis* L., *Salix purpurea* L., *Calystegia Silvatica* Chois. Отъ изхода на това дере извихме въ източна посока, минахме подъ с. Масатлари и Сусамското землище и излѣзохме на шосето за Сусамъ — Хасковскитѣ бани. Тукъ вече растителността малко-много измѣня своята физиономия. Голѣма частъ растения, свойствени на по-високитѣ пояси, постепенно отстъпва мѣсто на разни полски видове. *Paliurus*'а завзема видно мѣсто и се срѣща по цѣлия пѣть дори до банитѣ. Тукъ вирѣятъ още *Tribulus terrestris* L., *Echinops banaticus* Roch., *Centaurea Jacea* L., *Pyrus amygdaliforimis* и др. Стѣдъ едно нощуване на банитѣ, прѣзъ с. Горно Брѣстово (около 400. м.) заминахме за Буково (380 м.). Пѣтьтъ върви изпърво въ ю.-з. посока, а послѣ отива с.-з. къмъ с. Буково. На югъ отъ Брѣстово се издигатъ низки върхове: *Каманитъ*, *Хасаря* и *Дюлгеря*, задъ които стърчи върхътъ Айда, а на с. и с.-з. отъ сжщото село се издигатъ други три върха: *Гарваница*, *Градище*, и *Черенъ камъкъ*. По политѣ на тия височини, както и на първитѣ расте брѣстъ, а по-горѣ букъ. По цѣлия пѣть въ изобилие се срѣща и *Paliurus*. Близу на с.-з. отъ Буково се издига скалистиятъ връхъ Драгойна, високъ около 812 м. Той е едно отъ високитѣ прѣдгория на Родопитѣ. Частъ само отъ политѣ му е покрита съ растителность, а върхътъ комай е съвсѣмъ голъ, образуванъ отъ колосални андезитни балвани, безредно наслагани едни възъ други. Въ пукнатинитѣ на тия грамудаци растятъ въ изобилие разни папрати. Тукъ между друго се забѣлѣзватъ *Aegilops ovata* L., *Achillea odorata* Boch. въ изобилие, *Centaurea ma-*

culosa Lam. Notholaena Marantae Br., Asplenium Septentrionale Hill и др. Слѣдъ два часа бавенъе спуснахме се по стрѣмнитѣ каменисти склонове на Драгойна и трѣгнахме на с. къмъ селото Козлукъ (около 200 м. н. м.), отъ дѣто подирѣ кратка почивка заминахме за голѣмото с. Кара-Аланъ, лежещо малко ю.-з. отъ Козлукъ. Понеже имахме още нѣколко часа доклѣ мръкне, рѣшихме да гонимъ село Караджиларъ, отъ дѣто бѣхме излѣзли прѣди нѣколко деня. За тая цѣль трѣбаше отново да вземемъ ю.-и. посока все по течението на споменатата вече р. *Черъшка*, успоредно съ която вървимъ още отъ Козлукъ. Тая рѣка въ разнитѣ си прѣдѣли носи разни имена, споредъ имената на селата, прѣзъ които минува. Пѣтътъ е много сложенъ и минува прѣзъ най-плодородни мѣста, дѣто освѣнъ житни растения тукашното население обработва тютюнъ, сусамъ и памукъ. Надлъжъ по рѣката има множество мелници, които работятъ речн денонощно. Прѣди да се влѣзе въ селото отдѣсно на пѣтя се издига малка височина, наречена Хасаря (близу 382 м.). По пѣтя между Козлукъ — Кара-Аланъ — Караджиларъ растятъ: *Linaria Sofiaea* Vel., *Erythraea Centaureum* Pers., *Crepis foetida* L., *Chondrilla juncea* L., *Clematis integrifolia* L. и *Dianthus pinifolius* Sibth. (по Хасаря) и др.

Въ Караджиларъ прѣнощувахме и рано на другия день взехме пѣтя за с. Кетенликъ, разположено на с.-з. отъ първото село. Тукъ пѣтътъ минува по южнитѣ поли на Хасаря, прѣсича рѣка Мечка и слѣдъ малкъъ завой влиза въ с. Кетенликъ (280 м.). За да можемъ да разгледаме мѣстността по-добрѣ, рѣшихме отъ тукъ да се спуснемъ отново въ южна посока за с. Новаково. Отъ тукъ възлѣзохме на височината южно отъ селото. Задъ тая височина, по която разнообразни листнати дървета образуватъ непроходна гора, се простира друга по-голѣма височина, наречена *Дъга поляна*, поради малкото широко равнище на билото ѝ. Въ прѣкрасенъ планински кѣтъ между тии два гористи върха блика ледена вода, извѣстна въ цѣлата околностъ подъ името *Студената вода* или *Бай-Аргировата чешма* (850 м. н. м.), споредъ името на тоя, що съзидалъ тука малка чешмица. Покрай разнитѣ други растения тукъ въ гората се забѣлѣзватъ *Epipactis latifolia* All., *Epilobium montanum* L., *Prenanthes purpurea* L., *Campanula moesiaca* Vel., *Scutellaria Pichleli* Vel., *Atropa Belladonna* L. *Agrestis Spica Venti* L. и пр. По височинитѣ на с.-з. отъ Студената вода вирѣе букъ, повече джбъ, едролистна липа, осенъ, габъръ и др. растения. По тѣсна, мъчно проходима, ала весела пѣтека минахме прѣзъ гората, като вървѣхмъ все на западъ, доклѣ най-послѣ завихме край сѣ-

вернитѣ склонове на върха *Костенецъ*, отстоящъ не далечъ южно отъ Тополово, дѣто трѣбаше пакъ да ноцуваме и да приберемъ оставенитѣ си отъ по-рано материяли.

Отъ Тополово трѣбаше вече да се върнемъ за Станимака, понеже първата частъ на ескурзията ни се завършваше. Ала вмѣсто да вземемъ правия пътъ за тамъ, ние потеглихме изпърво на з., а послѣ на с.-з. и токо подъ с. Орѣшецъ завихме, та прѣзъ Горно-Арбанаси и Червенъ стигнахме въ манастира Св. Петка. На западъ ю.-з. отъ Тополово е държавната гора *Тикмата*, състоеща главно отъ габъръ, тукъ-тамъ *Crataegus*, *Fraginus excelsior* L. и пр. Сѣверо-западно отъ тая доста добръ запазена гора е *Шарлакъ-дере*, прѣзъ дѣто тече р. *Сушица*, която свлича водитѣ си откъмъ западнитѣ залѣсени склонове на Шиденски камъкъ. Въ тая мѣстность намѣрихъ доста растения, между които: *Genista Frivaldskyi* Boiss., *Sedum Ceraea* L., *Cystopteris fragilis* Brnh., *Allium carinatum* L., *Orchis saccifera* Brgnt., *Jasione Heldreichii* Boiss. и рѣдкия за българската флора видъ *Erigeron Willarsii* Bell., намѣренъ прѣзъ 1897. г. отъ Стрибрни на върха Мусала.

Сѣщия день привечеръ стигнахме въ Станимака, отъ дѣто веднага заминахме за Пловдивъ. Тукъ се раздѣлихме съ г. Бончева. Слѣдъ двудневна почивка азъ заминахъ прѣзъ Пазарджикъ за Пещера, за да продължъ своитѣ изслѣдвания въ западнитѣ Родопи. Тоя градецъ е разположенъ въ самото подножие на Родопитѣ въ весела котловина, заградена отъ с. съ низки бърда, а отъ ю. и з. отъ гориститѣ склонове на Родопитѣ. Мѣстностьта е около 470 м. висока надъ м. рав. Прѣзъ срѣдъ града тече тѣй наречената Стара-рѣка, която по-горѣ въ планината взима име Баташка рѣка, а долу подъ града — Пещерска рѣка. Тукъ ноцувахъ и рано сутринята, придруженъ отъ единъ помакъ, заминахъ за Батакъ. Изпърво завихме на ю.-з. и слѣдъ малко се вмъкнахме въ тѣсната лѣкатушна долина на Баташката рѣка. Пътътъ върви все въ ю.-ю.-з. посока безъ да напуска усойното рѣчно дѣно. Всичко наоколо е покрито съ свѣжа и разновидна растителность. Вѣковни гори покриватъ стрѣмнинитѣ и отъ двѣтѣ страни. Тукъ-тамъ се виждатъ само скали, надѣсени надъ самата рѣка, но и тѣ не сж съвсѣмъ голи. Отъ тѣхнитѣ пукнатини се подаватъ многобройни папрати, *Haberlea rhodopensis* Friv. и гиздавата *Campanula velutina* Vel., чиито хубави бѣли цвѣтове ясно се открояватъ върху тъмния фонъ на скалата. Тукъ растѣтъ още и други нѣкои видове, както *Ranunculus Flammula* L., *Ran. repens* L., *Gentiana asclepiadea* L., *Atropa Belladonna* и пр.

Колкото повече се влиза навътрѣ въ клисурата, растителността измѣня своя изгледъ, па и пътятъ постоянно се възкача. Джбовитѣ и габъровитѣ гори лека-полека отстъпятъ мѣсто на букитѣ. Още по-нагорѣ започватъ да се показватъ тукъ-тамъ отдѣлни борови дървета, докль най-послѣ иглолистнитѣ взиматъ надмощие надъ всички други дървеса. Подирѣ малко оставихме рѣката налѣво и слѣдъ кратко изкачване по доста стрѣменъ склонъ надѣсно, т. е. въ ю.-з.-з. посока стигнахме на малко голо плоскогорие, високо пѣщо около 1100 м. н. м. р. Великолѣпна е гледката, която тукъ се прѣдставя на туриста. Благодарение на хубавото врѣме, върховетѣ на окръжаващитѣ планини се виждатъ много ясно. Право на югъ се възвишава грамадниятъ баташки Карлъкъ, високъ 2078 м. надъ морето. Речи на западъ отъ него се синѣ Семеръ-аланъ (1940 м.), отъ дѣто черпи своитѣ води Баташката рѣка. Малко по на с.-з. отъ този послѣдниятъ е Семизтъ, високъ 1874 м. Тия върхове, заедно съ разклоненията, що излизатъ отъ тѣхъ, образуватъ единъ вѣнецъ, който разгражда откъмъ ю.-з. Баташкото плато. По политѣ на тия планини се простиратъ обширни вѣковни букови и хвойнови гори, които придаватъ голѣма прѣлестъ на тая и безъ туй хубава планинска мѣстность.

Слѣдъ нѣколко часа почивка тръгнахме за с. Фотинъ, на ю.-и. отъ Батакъ. Пътятъ сравнително е добъръ и минува прѣзъ селото Нова-Махала. Речи на половината пътъ между това село и Фотинъ е върхътъ *Куртлуджа*, дѣто покрай прѣобладаващия бѣлъ боръ, расте бѣла и червена ела и високи стари букаци. На сѣщия пътъ е чешмата *Кусъ-чешме*, съ бистра ледена вода. Мѣстностьта е гориста. Отдѣсно се възвишаватъ стрѣмни голи височини, съ голѣми каменливи сипеи, които вѣроятно влизатъ въ състава на баташкия Карлъкъ, а отлѣво е върхътъ Санджакъ (1875 м.). Слѣдъ като се прѣвали височината, пътятъ лжкатушно се спуща надолу за да се обърне въ камениста пѣтека, по която се влиза въ Фотинъ, прѣзъ дѣто тече Фотинската рѣка, що прибира водитѣ си отъ санджашкитѣ и горѣ споменатитѣ карлъшки прѣдгория; слѣдъ туй тя взима с.-и. посока и се влива въ Кръчимъ южно отъ Форцово. По височинитѣ между Батакъ и Фотинъ растятъ *Polygonum Bistorta* L., *Geum coccineum* Sbt., *Trachelium rumelicum* Hmpe., *Vaccinium Myrtillus* L. и разни други билки, а отъ иглолистнитѣ вирѣятъ тукъ-тамъ *Juniperus nana* Wld., повече *Abies pectinata* D. C. *Picea excelsa*, *Pinus Laricio* Poir., *Pinus Peuce* Grsb., *Pinus sylvestris* L. Отъ листнатитѣ прѣобладава букъ, особно по върха Куртлуджа.

Селото Фотинъ е на самата граница, дѣто е и нашиятъ пограниченъ постъ. Тукъ прѣкарахме нощта и на утрото се упитихме за мѣстносттата *Тилкили*. Щомъ излѣзохме отъ селото, почнахме да възлизаме по голѣма стрѣмнина, покрита съ стройни иглолистни дървета. Пътеката, по която трѣбаше да се катеримъ, е камениста и досущъ измита отъ поройнитѣ дъждове, а това я правѣше още по-мѣчна. Изпърво тя има ю.-и. посока, но слѣдъ малко бързо завива на ю. и послѣ на ю.-и., докѣтѣ се изкачимъ до нѣйдѣ на гористия върхъ Чалъ-тепе (1589 м.). Отъ тукъ надолу пътятъ сѣщо е твърдѣ моренъ. Боровинкитѣ на всѣка крачка спѣватъ пѣшака. Благодарение на вѣковната гора, която тукъ-тамъ пострадала отъ пожаръ, ние вървимъ подъ постоянна сѣнка. Отдѣсно на Чалъ-тепе е върхътъ *Ески-юртъ*, сѣщо утѣналъ въ гора, а недалечъ отъ него се издига и други гористъ върхъ Шанкаля. Отъ тукъ бързо навляме надолу, докѣтѣ слѣземъ въ *Еланъ-дере*, поено отъ бистра планинска рѣчица, образувана отъ нѣколко потоца, които извираатъ отъ височинитѣ източно отъ Сарлаж-тепе (1910 м.). Отъ тукъ до Тилкили разстоянието е малко. Пътятъ отново се качва, минува близу край развалинитѣ на разрушеното вече юрушко село *Хундулу-махале* и излиза право на Тилкили. Тукъ сме на самата граница, дѣто има нашъ лѣтенъ войнишки постъ. Мѣстносттата е лѣсиста. Обширна гора отъ стройни ели се простира въ всички посоки. На и. е Тъмръшъ, на ю. и ю.-з. цѣлъ лабиринтъ долини и върхове, отъ които особно добръ се вижда Таусунъ-кара (1488 м.), лежещъ юго-западно отъ нашия постъ. Тукъ прѣстояхме два дена, слѣдъ което отново минахме прѣзъ Еланъ-дере, завихме прѣзъ мѣстносттата наречена *Кабата* и възлѣзохме на върха Чалъ-тепе, въ чийто и. поли се намира другъ нашъ пограниченъ постъ. Този върхъ е токо речи голъ; въ най-горната си частъ се състои отъ натъркаляни и съборени едри каменни балвани. Залѣсени сѣ само неговитѣ хълбоци. Въ изобилие тукъ растѣтъ разни кѣпини, малини, ягоди и пр. Слѣдъ малка обиколка навалихме височината и поехме речи сѣверна посока. Минахме прѣзъ усоевъ планински прорѣзъ, покритъ съ висока букова гора. Тая мѣстность се нарича *Орманово*. Слѣдъ продължително лѣкатушение низъ гората най-послѣ стигнахме до фотинския пограниченъ постъ, разположенъ въ живописната мѣстность *Шипковица*, западно отъ Фотинъ. Тукъ букътъ отстѣпя мѣсто изпърво на габера, а послѣ на дѣба, който покрива обширни пространства, дори до запустѣлото помашко село Форцово или Фераево, разположено на с.-и. отъ Фотинъ. Пътятъ за туй село минува прѣзъ мѣст-

ноститѣ *Подгорица* и *Крачунгъ*, слѣдъ което се простира на доста голѣмо протежение токо речи успоредно съ Фотинската рѣка — единъ отъ многобройнитѣ притоци на Кръчимъ. Обширни джбови гори, промѣсени съ дрѣнъ, осенъ, габъръ и пр., покриватъ този планински край. Между Фотинъ и Форцово покрай другитѣ билки вирѣятъ и слѣднитѣ видове: *Nepeta nuda* Jacq., *Vaccinium Myrtillus* L., *Galium alpinum* Schur., *Gentiana punctata* L., *Polygonum lapathifolium* L., *Calamagrostis Halleriana* D. C. и *C. Sylvatica* D. C., *Salix cinerea* L., *Plantago carinata* Schrd., *Hypericum rumelicum* Boiss., *Pyrethrum corymbosum* W (L.), *Pyrola rotundifolia* L., *Dianthus superbus* L., var. *alpestris* Wimm. и др.

Въ едничката малко-много запазена селска постройка въ Форцово се помѣщава единъ отъ нашитѣ погранични военни постове. Слѣдъ кратка почивка тукъ, рѣшихме да заминемъ за доста голѣмото българско село Ясж-кория. Пѣтьтъ води въ с.-и. посока и не държи повече отъ три часа. Изобщо той е добъръ, макаръ че и тукъ има доста голѣми изкачвания. Ясж-кория е разположено въ високо плоскогорие, заградено речи отъредъ съ вѣнецъ отъ залѣсени височини. Ония отъ тѣхъ, които сж разположени отъ и. къмъ ю.-з., носятъ слѣднитѣ имена: *Китерица*, *Поречки върхъ*, *Прѣдълата*, *Беглийски върхъ*, *Мезиря*, *Ибрема*, *Къдишкови*, *Бъюкъ-манѣръ*, до него *Ючюкъ-манѣръ*, *Санджикъ*, *Грѣбето*, чийто поли се спущатъ до мѣстността *Дълбокото дере* ю.-з. отъ селото. Височинитѣ на и.-и.-ю. отъ селото сж три: *Св. Недѣля*, *Св. Елена* и *Св. Илия*. Тѣхнитѣ чуки сж токо речи голи, скалисти, а по политѣ имъ расте повече боръ и ела. Върхътъ *Св. Недѣля* е осамотенъ, звѣновиденъ и съставя кржгозорна точка за Пазарджишкото поле. Изобщо по високитѣ части на всички споменати върхове прѣобладава бѣлиятъ боръ и бѣлата ела. Черниятъ боръ и червената ела сжщо се срѣщатъ, ала по-рѣдко. По политѣ има букови гори, а въ по-низкитѣ мѣста габеръ и джбъ.

Отъ Ясж-кория продължихме своя пѣть прѣзъ Осеновското землище и върха *Малъ-тепе* (1271 м.), за с. Кръчимъ, с.-и. отъ тука. До *Малъ-тепе* пѣтьтъ е много добъръ и минава прѣзъ живописни мѣста, покрити съ гора прѣимуществено отъ бѣлъ боръ и букъ въ низинитѣ. Изпърво се спущаме надолу, минаваме редъ незначителни планински потоци, извиваме ту надѣсно, ту налѣво, докѣл почнемъ да се качваме по политѣ на *Малъ-тепе*. Този върхъ е голъ и речи осамотенъ. Тука има нашъ пограниченъ зименъ постъ. Всичко отъ Ясж-кория до тукъ се дохожда за около 2 $\frac{1}{2}$ часа. На

ю.-и. отъ Малъ-тепе се открива хубава панорама. Далечъ на югъ се вижда какъ лжкатуши пълнливата Кръчимска рѣка въ своето каменисто корито, стѣснено отъ гористи височини. Източно отъ Кръчимската рѣка се сгнѣе Тъмръшъ Модеръ, по на югъ Персенкъ и редъ други второстепени височини, които заедно съ многобройнитѣ долини, що ги прѣсичатъ въ разни посоки, образуватъ истински необятенъ лабиринтъ. На западъ отъ Малъ-тепе се издига голъ заобленъ върхъ *Тмана*, чийто склонъ е покритъ съ бучъ.

Възползувахме се отъ доброто врѣме, та слѣдъ кратка почивка на Малъ-тепенскиятъ постъ се упѣтихме за Кръчимъ. Колкото пътятъ отъ Ясж-кория до Малъ-тепе е сложенъ, толкова отъ този върхъ до Кръчимъ е неносенъ. Въ продължение на повече отъ 2½ часа трѣбаше да се спущаме по стрѣмна, камениста пътека, усѣяна съ малки и голѣми грамадаци. Най-сетнѣ слѣзохме въ коритото на Кръчимската рѣка, която прѣзъ голѣмъ проломъ излиза отъ тѣсното си корито и се спуща къмъ полето, дѣто се раздѣля на два рѣкава, за да се влѣе въ Марица. Източниятъ отъ рѣкавитѣ именно се нарича Кръчимска рѣка. Отъ с. Кръчимъ заминахме за Перушица. Тукъ пътятъ е прѣвъзходенъ и върви край сѣвернитѣ поли на Родопитѣ. Налѣво отъ насъ е Пловдивското поле, а по къмъ с.-з. Баба-баиръ — редъ хълмове, нанизани по сѣвернитѣ поли на Родопитѣ откъмъ Т.-Пазарджикъ за Кръчимъ. Въ Перушица пристигнахме надвечеръ, слѣдъ като прѣминахме прѣзъ твърдъ плодородна мѣстность, дѣто покрай разнитѣ овощни дървета вирѣе и тютюнъ. Тукъ прѣспахме и на утрото заминахме за Пловдивъ, съ което и азъ завършихъ моята екскурзия.

Освѣнъ материалитѣ, събрани въ Родопитѣ, тукъ влизатъ и други нѣкои растения, които прѣзъ 1898. г. събрахъ по Рила, главно въ околноститѣ на Сухо-езеро, по Кобилино бранище и по пътя отъ тамъ за Чамъ-кория прѣзъ Сръбско село (Мала Църква). Прѣзъ врѣме на тая екскурзия тукъ азъ намѣрихъ нѣколко доста рѣдки растения, особно рози, които изпратихъ за сравнение на извѣстния родологъ François Grépin — директоръ на държав. ботанич. градина въ Брюкселъ. Оказа се, че нѣкои отъ тия рози сж нови за България. Такива сж видоветѣ: *Rosa pomifera* Herrm., *R. glutinosa* Sibth et Sm., *R. coriifolia* Fries., *R. glauca* Vill., *R. micrantha* Sm., *R. micrantha* Sm. var.?, *R. Sepium* Thuill., видоизмѣнение отъ групата *R. lutetiana* Lem., отъ групата *R. dumalis* Beschst. и др. На Кобилино бранище събрахъ и една доста интересна форма отъ *Saxifraga*

Aizon Jcq., отъ която г. Веленовски създаде новъ вариететъ — *S. Aizon Jcq. var. orbellia*.¹⁾

Всички растения, що влизать въ тая статия, сж около 470, наредени по Нуман'овия *Conspectus Florae Europaeae*. Видоветѣ, намѣрени за пръвъ пѣтъ въ Родопитѣ иматъ знакъ *, а при алпийскитѣ видове стои знакъ •. При открититѣ за пръвъ пѣтъ въ България стои знакъ **. При изучаванье на материялитѣ си най-вече се ползувахъ отъ слѣдната ботаническа литература: *Flora Bulgarica* отъ J. Velenovsky, заедно съ прибавкитѣ; трудоветѣ на Панчић, Dr H. Dingler — *Das Rhodopegebirge und seine Vegetation*, (*Zeitschr. des Deut. und. Oest. Alpenvereins*, 1877., Heft. 2, ст. 195—223), *Tableau analytique des Roses européennes*, par François Crépin, вмѣстено въ *Comptes-rendus des séances de la Société Royale de Botanique de Belgique*, 1892, Mai, p. 66, Флора средней Россіи отъ П. Маевскій, Родопитѣ и Рилската планина и пихната растителность (Мѣс. т. III, IV и V) отъ Ст. Георгиевъ, *Atlas manuel de Botanique* par J. Deniker, 1886 и всички други статии, обнародвани до сега по българската растителность.

За свой дългъ смѣтамъ най-послѣ да изкажа своята най-голѣма благодарность на проф. д-ръ Веленовски и на г. Стрибрни — на първия за дѣто имѣ добрината да провѣри и опрѣдѣли ония видове, въ които азъ се съмнѣвахъ, а на втория за готовността, съ която ме улесни твърдѣ много съ своя богатъ хербаръ отъ нашенски и чужди растения. Моята благодарность така сжщо и на завѣдующия ботанически институтъ при Висшето училище, за дѣто ми остави на разположение всичко, отъ което имахъ нужда при изпълнение на своята задача.

IV.

Списъкъ на растенията, които намѣрихъ въ Родопитѣ.

Dicotyledoneae Juss.

Ranunculaceae Juss.

Clematis Vitalba L. По пѣтя отъ Орѣщецъ за манастира Св. Петка, надъ Станимака.

¹⁾ Вж. Oest. bot. Zeitsch. 1901, Achter Nachtrag zur Flora von Bulgarien, стр. 1.

Clematis integrifolia L. Изъ царевичитѣ по пѣтя между Кара-аланъ и Караджиларъ. Събирахъ го и при пъленъ цвѣтъ.

Hepatica triloba Chx. Въ клисурата между Пещера и Батакъ.

Thalictrum aquilegifolium L. По Кобилино бранище на пѣтя отъ Рилския манастиръ за Чамъ-кория. Споредъ Урумова твърдѣ разпространено въ Търновско.

Thalictrum minus L. Между Пещера и Батакъ.

●*Ranunculus montanus* W. (*R. nivalis* Jacq.). По Кобилино бранище, както и по други алпийски поляни въ Рила.

**R. Flammula* L. По мочурливитѣ мѣста въ клисурата между Батакъ и Фотинъ.

R. arvensis L. Изъ нивитѣ въ най-низкитѣ поли на Родопитѣ.

Nigella arvensis L. На много мѣста изъ нивитѣ въ Босилеградско и Хасковско.

**N. Sativa* L. Тукъ-тамъ въ Узунъ-дере. До колкото ми е извѣстно до сега туй растение е намѣрено само въ с. Бейбьой отъ Шкорпила.

Caltha palustris L. По влажнитѣ сѣнчести мѣста въ клисурата между Пещера и Батакъ.

●*Aquilegia aurea* Јанка. По пѣти между Рилския манастиръ и Чамъ-кория прѣзъ Кобилино бранище. Сжщиятъ видъ е намѣренъ отъ Георгиева въ Родопитѣ по скалиститѣ крайрѣчни, а тѣй сжщо и сухи мѣста въ долинитѣ на р. Чавча (Айранъ-дере), Ибаръ, М. Марица, по Ченгене чалъ.

Стеблото му е отъ 25—50 с. м. Цвѣти прѣзъ юли и августъ. За подробната му диагноза вж. Vel. Fl. blg, 14.

Berberideae Vent.

Berberis vulgaris L. Въ храсталацитѣ по пѣтя между Тополово—Орѣшецъ и Св. Петка надъ Станимака.

Papaveraceae D. C.

Papaver Rhoeas L. Всждѣ по нивитѣ въ Босилеградско, Хасковско и др.

P. dubium L. По сжщитѣ мѣста.

Roemeria hybrida L. Между Кръчимъ и Малъ-тепе.

Chelidonium majus L. Въ сѣнчеститѣ усойни мѣста по течението на Фотинската рѣка, Душка-дере, Пещера—Батакъ и пр. Изобщо твърдѣ обикновено.

Cruciferae Juss.

Turritis glabra L. По пѣтя отъ Бачково за Югово.

Erysimum canescens L. Между Т.-Пазарджикъ и Пещера.

E. repandum L. По полето въ Босилеградско и др.

Sinapis arvensis L. По най-нискитѣ поли на Родопитѣ, по нивитѣ и др.

Berteroa incana D. C. (*Alyssum inc.* L. *Farsetia inc.* Br.) Между Караджиларъ и Сърнъчъ, особено въ мѣстността Кьомюрджи Тарла на границата, около самия пограниченъ постъ. Сѣщия видъ намѣрихъ на много мѣста и въ Узунъ-дере, отивайки отъ Сърначъ за Хасковскитѣ бани. Вариира.

Alyssum orientale Ard. Между Тополово и Станимака.

Al. murale W. K. По сухитѣ каменисти мѣста надъ Тополово.

Thlaspi arvense L. Всждѣ речи по политѣ на Родопитѣ.

T. praesox Wulf. Между Нова-Махала и Фотинъ.

Lepidium Draba L. Въ околноститѣ на Тополово, Станимака и др. Обикновено.

Lipidium ruderae L. Като горното.

Capsella bursa pastoris Mch. Всждѣ обикновено.

Myagrum perfoliatum L. Всждѣ въ Босилеградско и др. Обикн.

Resedaceae D. C.

Reseda inodora Rchb. Между Станимака, Бачковския манастиръ и Югово.

Reseda lutea L. Въ околноститѣ на с. Югово и др.

Cistineae D. C.

Helianthemum ledifolium G. По пѣтя отъ Шилденски камѣкъ за Тополово.

H. vulgare G. Между Чаль-тепе и Кръчимъ.

H. canum Dun. По Кобилино бранище.

Violarieae D. C.

Viola odorata L. На много мѣста въ Родопитѣ.

V. silvatica Fr. Между Югово и Павелско, по Анатимитѣ и др.

●*V. biflora* L. По влажнитѣ сѣнчести мѣста около Сухо езеро, на Кобилино бранище. Намѣрена е отъ Георг. и въ Родопитѣ.

V. tricolor L. Тукъ-тамъ въ Родопитѣ по влажнитѣ мѣста. По Бешулакъ покрива цѣли пространства.

Polygaleæ Juss.

Polygala major Jsq. По високитѣ поляни между Лъжавица и Крушово. Много по-едри екз. събрахъ и по върха Синиръ-тепе. По-рано този видъ е намѣренъ надъ Станимака отъ Велен.

Silenaceæ (Bartl.) Lindl.

Agrostema Githago L. (*Githago segetum* Dsf). Всждѣ изъ посѣ-
витѣ по политѣ на Родопитѣ.

A. coronaria L. Между Бачково и Югово. Въ храсталадитѣ по течението на Бѣлишката рѣка.

Silene noctiflora L. Изъ нивитѣ въ Босилеградско и Стани-
машко.

S. dichotoma Ehrh. Между Югово и Павелско.

S. inflata Sm. (*S. Cucubalus* W., *S. venosa* Gilib., *Cucubalus* Behen. L.). По ливадитѣ на Бешулакъ и изобщо по високитѣ родопски равнини. Варира твърдѣ много. Срѣща се и по течението на Бѣлишката рѣка. Прѣдава бѣлизнявъ колоритъ на нѣкои мѣста, дѣто го има повече.

Sarpanaria officinalis L. Обикновено въ Родопитѣ край поточ-
нитѣ мѣста.

Gypsophyla muralis L. По голитѣ поли на Хасаря, недалечъ
отъ Караджиларъ.

Dianthus superbus, var. *alpestris* Wimm. (*D. Wimmerii* Wich.).
Образува гиздави малки групи по влажнитѣ мѣста и въ долинитѣ
около Фотинъ, по Шипковица, Малъ-тепе и др.

●*Dianthus microlepis* Boiss. Твърдѣ обикновено по Кобирино бра-
нище, не далечъ отъ Сухото езеро. Срѣща се и по най-високитѣ
Родопски височини (Геор. и др.).

Листя отъ 1—3 с. м. \times 1 м. м., цѣлото разстояние има отъ
4—5 с. м., чашка 1 с. м. \times 2½ м. м. (Вел.). Цвѣти прѣзъ юли
и августъ. За подробното описание на този видъ вж. Vel. Fl. bul. ст. 71.

Прѣзъ 1897 Стрб. е намѣрилъ на Мусалла новъ сортетъ на
този алпийски видъ. — *D. microlepis* Boiss 3) var. *Musalæ* (вж.
Vel., Fl. blg. Sup. ст. 41).

D. pinifolius Sibth. (*D. brevifolius* Friv.). Срѣща се по сухитѣ
каменисти поли на Хасаря, близу до Караджиларъ. Стебло 30—40

с. м., главички отъ $1\frac{1}{2}$ — 2 с. м. въ диям. За подробности вж. Fl. blg. 78.

Dianthus giganteus d'Urv. 1882 (*D. biternatus* Schur., *D. pruinosus* Jka, 1858). Всждѣ низъ джбравитѣ по политѣ на Шафрана, св. Илия и други височини между Караджиларъ и Сърнъчъ, както и по самата граница. Нѣкои екз. достигатъ до 1.30 м. Сжщия видъ се срѣща всждѣ по склоноветѣ на Бешулакъ, а именно въ мѣстноститѣ: Тузлата, Пашалийската гора, Локвата, Сждуля, Циганецъ, Голѣмитѣ ливади, Крайща и др. (Вж. Vel., Fl. blg. 81 и Sup., 44.)

D. turcicus Vel., 1892. Този новъ за България видъ, намѣренъ за прѣвъ пжтъ отъ Стрибрни около Станимака прѣзъ 1891 г., събрахъ по ливадитѣ между Павелско и Дрѣново; срѣща се главно по ливадитѣ между Пашалийската гора и Чепмата. Доста рѣдко растение. За пълната му диагноза вж. Fl. blg., Sup. 48.

Alsineæ Bartl.

Cerastium rectum Friv. Между Станимака и Бачково.

C. arvense L. Между Югово и Павелско.

Stellaria media Cyr. На много мѣста въ подножието на Родопскитѣ височини.

S. holostea L. По върховетѣ Бешулакъ, Анатимитѣ и др.

Arenaria serpyllifolia L. По необработенитѣ мѣста около Новово, Кетенликъ и др.

A. biflora L. По Кобилино бранище, около Сухо езеро. Срѣща се и по Родопскитѣ височини.

Lineæ D. C.

Linum catharticum L. По Анатимитѣ, между Югово и Павелско.

L. hirsutum L. Всждѣ между Югово и Павелско, особно въ мѣстността Анатимитѣ. Срѣща се така ежщо и по пжтя, що води отъ Бачковския манастиръ за Югово прѣзъ Сливово дере, Дълга усойка, Двѣтѣ черкви, Душковецъ и пр. Екз. отъ тая мѣстность сж по-едри.

Malvaceæ Br.

Althaea cannabina L. На много мѣста по политѣ на Родопитѣ, особно по камениститѣ мѣста и край храсталацитѣ.

Althaea hirsuta L. По нарѣдко отъ горното.

**Lavatera thuringiaca* L. (*L. Thirkiana* C, K.) var. *bulgarica* Vel. 1892. Твърдѣ обичиновенъ въ Узунъ-Дере. Този новъ сортетъ

до сега бѣ намѣренъ само около Садово отъ Стрб. (Гл. Fl. blg., Sup. с. 59.).

Tiliaceae Juss.

Tilia alba W. K. (*T. argentea* Dsf.). Въ гората с.-западно отъ мѣстността Студената вода (850—980. м.), надъ Новаково. Бѣше въ пълень разцвѣтъ. Намира се и по източнитѣ поли на в. Баба, въ Сливово-дере и др. По-рѣдко се срѣща по политѣ на в. Айда.

Hypericineae D. C.

Hypericum olympicum L. Тукъ-тамъ на групи въ Узунъ-дере. Екземп. приличатъ на ония отъ Гърция.

H. perforatum, forma, L. Срѣща се на много мѣста въ Родопитѣ. Особно разпространено по пѣтя отъ Павелско за Дръново, прѣзъ в. Бешулакъ. Въ Павелско го наричатъ *Постъчево биле*.

H. hirsutum L. Всждѣ въ лѣсоветѣ, прѣимуществено по сѣнчеститѣ мѣста и по ливадитѣ на Бешулакъ.

H. Montbretii Sp. Тукъ-тамъ между Станимака и Бачково.

H. Rumelicum Boiss. Всждѣ по варовицитѣ и по сухитѣ ридове между Фотинъ и Форцово, по границата. За диагнозата на този видъ вж. Vel. Fl. blg. 108.

Acerineae D. C.

Acer Tataricum L. Обикновено всждѣ изъ гората между Караджиларъ и Сърнъчъ. *Кошничаръ* — Сърнъчъ.

A. campestre L. На много мѣста по Родопитѣ. *Келевъ-габъръ* — Тополово.

Acer sp. Обикн. по височинитѣ на ю. отъ Тополово.

**A. platanoides* L. Въ гората около Сърнъчъ, както и по самата граница. *Кавлинъ* — Сърнъчъ.

Ampelideae H. B. K.

Vitis Vinifera L. По пѣтя отъ Бачковския манастиръ за Югово въ мѣстноститѣ: Сливово-дере, Дълга усойка и др. заедно съ *Clematis*, *Tilia* и пр. Достига грамадни размѣри.

Geraniaceae D. C.

Geranium macrorhizon L. Срѣща се по всички и Родопски подалпийски височини, главно по камениститѣ мѣста.

G. Sanguineum L. По сухитѣ каменисти склонове на много Родопски върхове.

G. pyrenaicum L. На много мѣста по Родопитѣ.

G. molle L. Между Станимака и Бачково и др.

Balsamineae A. Rich.

●*Impatiens noli tangere* L. По влажнитѣ сѣнчести и крайпоточни мѣста въ дефилето между Пещера и Батакъ, въ усойтѣ по върха Куртлуджа, между Нова-Махала и Фотинѣ. Въ още по-големо изобилие се срѣща въ в. Дълбоко дере между Форцово и Ясж-Курия.

Zygophylleae Br.

Tribulus terrestris L. Покрай пѣтищата, по пѣсьчливата почва между Узунъ-дере и Хасковскитѣ бани, изъ царевичитѣ.

Rutaceae Juss.

Dictamnus albus L. Между Станимака и Бачково.

Rhamnaceae Br.

Paleurus aculeatus Lam. (*P. australis* G.). По пѣтя отъ Асѣнъова крѣпость прѣзъ Бачковския манастиръ за Югово. Въ Душкадере достига приблизително до 600 м. надъ морското равнище. Повече се срѣща между Узунъ-дере и Хасковскитѣ бани. Между Кръчимъ и Перущица.

Terebinthaceae Juss.

Rhus Cotinus L. По източнитѣ поли на Баба, по политѣ на Анатемитѣ, достига до 800 м. надъ м. р. Покрива цѣли пространства между Тополово и Новаково (Иланъ-тепе на с.-и. отъ Тополово). Всждѣ по малко между Югово и Павелско.

Papilionaceae L.

Genista carinalis Grsb. Spicil. (*G. gracilis* Spach.). Всждѣ изъ джбовата гора около Фотинѣ, Шипковица, Форцово и др.

*●*Genista Frivaldskyi* Boiss. (*G. depressa* Grsb; *G. procumbens* Friv.). По пѣтя между Шарлакъ-дере и Горно-Арбанасе. До сега

това растение е намѣрено по алпийскитѣ поляни надъ Калоферъ (Wagner), надъ Карлово (Friv), въ Петроханския балванъ (Vel.). Цвѣтни дръжки отъ 7 — 15 с.м., срѣдни листа 2 с.м. \times 3—4 м.м., чашка 4—4½ м.м. дълга, цѣлията цвѣтъ 1½ с.м. дългъ, чупката отъ 1½—2 с.м. \times 3—4 м.м. За подробности вж. Vel. Fl. blg., 124.

Cytisus hirsutus L. По пътя между Ерѣ-Къоприя за Тополово прѣзъ Шилденски камѣкъ. Споредъ Вел. срѣща се всждѣ въ България.

C. austriacus? L. По върха Синирѣ-Тепе

Ononis Columnneae All. (*O. parviflora* Sam.). Сърнѣтъ—Узунѣ-дере.

Medicago rhodopea Vel. 1893. Между Станимака и Бачково. За диагнозата на този новъ видъ на Велен. вж., сжщия, Fl. blg. Sup. 75. Най-напредъ този видъ е намѣренъ отъ Вел. около Станимака и Текира, а по-сетнѣ и отъ Стрибрни до Пещера.

M. falcata L. Между Козлукъ и Карааланъ.

M. lupulina L. Разпространено на много мѣста по политѣ на Родопитѣ.

Melilotus officinalis Dsr. (*M. arvensis* Wllr.). Всждѣ почти по нивитѣ около Караджиларѣ, Новаково и др.

M. alba Dsr. Тамъ, дѣто и горното.

Trifolium alpestre L. Между Ерѣ-Къоприя и Тополово, по сухитѣ трѣвисти мѣста. Вѣроятно и другадѣ.

T. alpestre L. var. *brevifolium* Boiss. Узунѣ-дере—Хасковскитѣ бани.

●**Trifolium medium* L. subs. *balcanicum* Vel. 1891. Твърдѣ обыкновенно по подалпийскитѣ ливади между Павелско и Дрѣново, особено по политѣ на Бешулакъ въ землището на с. Дрѣново. Порано сжщото растение е намѣрено по Витоша и Рила (Vel.), по Осоговската пл. (Vel. Vs.) и надъ Бѣлово (Стрб.). За подробности гл. Fl. blg., ст. 135.

T. pratense L. На много мѣста по Родопскитѣ пасбища.

T. hirtum All. По горния пътъ отъ Дупница за Рилския манастиръ.

T. arvense L. Въ изобилие всждѣ по неразработенитѣ мѣста между Бачково и Югово. Покрива цѣли пространства. На мѣстѣ се срѣща заедно съ *T. Preslianum* Boiss. Особено разпространено по нивитѣ и ливадитѣ между Караджиларѣ и Сърнѣтъ. Около нашия пограниченъ постъ на Кюмюрджи-Тарла покрива цѣли пространства.

T. purpureum Lois. По камениститѣ поли на в. Драгойна.

T. repens L. По високитѣ ливади между Бешулакѣ и Крушово. *Trifolium Preslianum* Boiss. (*T. affine* Presl.). На много мѣста по сухитѣ трѣвисти поли на Родопитѣ, заедно съ *T. arvense* L. Туй рѣдко за нашата флора растение прѣвъ пжтъ е намѣрено отъ Стрибрни близо до Скобелево. (Вж. Fl. blg. Sup. 81.).

T. campestre Schreb., Въ джбравата около Ерѣ-Кюприя, Бѣлица, Карамѣшѣ. По политѣ на Синирѣ-тепе и вѣроятно на други още мѣста.

Lotus corniculatus L. На много мѣста по политѣ на Родопитѣ. Гашна-дере, Лжковица, Крушово и др.

Coronilla varia L. По склоноветѣ на Родопитѣ, особено по ливадитѣ между Югово и Павелско, по Анатемитѣ, въ мѣстността Блатата и др.

Colutea melanocalyx Boiss. (*C. arborescens* Vel. olim.). По пжтя между Горно-Арбанасе и Червенѣ. Цѣвти прѣвъ юли. За диагнозата на този видѣ вж. Fl. blg., ст. 147. Споредъ Геор. туй растение е твърдѣ разпространено въ източната часть на Южна Бѣлг. (Геор. Родопитѣ и Рилската пл. и пр. Мсб. IV. 571.).

Galega officinalis L. Всждѣ по влажнитѣ крайпоточни мѣста.

Astragalus pugioniferus Fisch. (*A. subulatus* var. *strictus* Grsb.). Въ пукнатинитѣ на скалитѣ по течението на Бачковската рѣка.

Onobrychis alba W. K. По височинитѣ между Югово и Павелско. Споредъ Vel. растението е типично и напълно идентично съ унгарското (гл. Fl. blg. sup. 89).

Vicia grandiflora Scr. (*V. sordida* W. K.). Изъ джбовата горица въ Узунѣ-дере. Обикн. .

V. angustifolia Rth. Изъ нивитѣ и кукурузитѣ по политѣ на Родопитѣ.

V. onobrychioides L. Образува отдѣлни гнѣзда всждѣ по ливадитѣ по Бешулакѣ, на пжтя отъ Павелско за Дрѣново. До сега този видѣ бѣ намѣренъ при Беледниханѣ (Шк.), при Радомиръ и надъ Дермендере (Стрб.).

V. varia Host. (*V. villosa* var. *glabrescens* K., *V. pseudocracca* Vel. 1886.). Срѣща се почти всждѣ по разработенитѣ мѣста, нивитѣ и пр. по политѣ на Родопитѣ.

Ervum Lens L. На много мѣста я сѣятъ.

Rosaceae Juss.

Prunus avium L. На много мѣста въ Родопитѣ.

P. Mahaleb L. Въ Крушово, Дрѣново и други помашки села.

P. spinosa L. По пѣтя отъ Бачково за Югово. По политѣ на Анатамитѣ и Гора, близу до 800 м. н. м. рав. По Вел. срѣща се въ цѣла южна България, по Витоша, около София и пр.; широко разпространено и чудно промѣнливо. (Fl. blg. sup., ст. 96).

P. divaricata Ledb. Въ Гората между Бачковския манастиръ и Югово.

Pyrus amygdaliformis Vill. Срѣща се на много мѣста, особно въ източнитѣ низки Родопи. *Кокалици* — въ Сърнѣтъ. Срѣща се тукъ-тамъ усамотено и въ Узунъ-Дере и Домузъ-дере.

Sorbus Aria Crtz. Между Югово и Павелско въ гората.

S. torminalis L. Въ гората по височинитѣ с.-з. отъ Студената вода надъ Новаково.

Crataegus monogyna Jacq. По политѣ на Анатимитѣ и Гора, както и по политѣ на Бешулакъ. Вѣроятно и другѣдѣ.

Roseae D. C.

Rubus caesius L. На много мѣста по Родопитѣ, както по Чальтепе и др., покрива цѣли пространства.

R. tomentosus Borekh. (*R. canescens* D. C.). Като горното.

Fragaria collina Ehr. Срѣща се въ изобилие всѣдѣ по Родопитѣ. Намѣстѣ покрива цѣли пространства. Тоя видъ въ Батакъ наричатъ *зунѣци*, а въ Югово — *сунѣци*.

F. vesca L. Изъ шубрацитѣ се срѣща не по-малко отъ горното. Въ Батакъ наричатъ тоя видъ *паници*.

Potentilla rupestris L. Въ мѣстността Плочитѣ между Рилския манастиръ и Сръбско село.

P. obscura Lehm. Около Куру-чешме, по политѣ на Мандрата, Шафрана, по Кьомюрджи Тарла (Елъ-Гидикъ). Не по-малко се намира и по пѣтя отъ Павелско за Дръново въ мѣстноститѣ Св. Георги, Пашалийската гора, по Ильчовъ гробъ, Марчевица, Тузлата и др. Отъ всичко се вижда, че този видъ е твърдѣ разпространенъ по цѣлитѣ Родопи. (Гл. Fl. blg., sup. 99.).

P. argentea L. Тѣй сѣщо твърдѣ разпространено по Родопитѣ.

P. Tormentilla Sep. Тукъ-тамъ по влажнитѣ мѣста по Родопитѣ.

P. micrantha Ramond. Въ лѣсоветѣ въ по-низкитѣ Родопски планини.

● *Geum montanum* L. Прѣкрасни екз. отъ това хубаво планинско растение събрахъ по Кобирино бранище. Срѣща се и по другитѣ Рилски алпийски поляни.

● *G. coccineum* Sibth. (*G. Sadleri* Friv., *G. grandiflorum* C. K., *G. macedonicum* Friv.). Това растение намѣрихъ въ усойнитѣ мѣста въ Гашна-дере. Въ мѣстността Локвата на върха Бешулакъ. Въ подирната мѣстность е много по-слабо распространено. Срѣща се и въ усойтѣ по височинитѣ между Нова-Махала и Фотинѣ, особно около каракачанскитѣ колиби. По върха Ески-юртѣ надѣсно отъ Чалъ-тепе. Повече распространено въ Еланъ-дере. Тукъ-тамъ го видѣхъ и между Тилели и Форцово въ влажнитѣ долини. Сжщото растение събрахъ по-рано и въ Рила, по пътя отъ Рилския манастиръ за Сухо езеро. Поради приятно огнено-червенитѣ си цвѣтове се забѣлѣзва отдалечъ и придава особно хубавъ изгледъ на околната зеленина. По-рано въ Родопитѣ този видъ е намѣренъ въ Бѣла черква (Шк. мл.) и по Карлъка (Rs.).

Rosa arvensis Huds (*R. repens* Scr.).¹⁾ Този видъ варира отъ носително листнитѣ жбци, които сж ту прости, ту двойни или сложно жлѣзисти. Листя има гладки или малко-много мѣхави. До сега въ България е намѣренъ въ низкитѣ хълмисти мѣстности въ Балкана близу до с. Микре (Vel.).

Наб. Намира се въ цѣла Европа, съ изключение на най-сѣвернитѣ страни, нѣкои точки отъ сръдноморската областъ и южна Русия.

Rosa gallica L. (*R. cordifolia* Chab., *R. pumila* Jcq.). Листя има кожести, отгорѣ голи, отдолу сиво-зелени, власисти или голи, вржли или елиптически, напилени. Цвѣтове едри, правостоещи, пурпурни. Плодъ кълбестъ, тъмно-червенъ: Яйчници седещи. Клонкитѣ и безцвѣтнитѣ разклонения покрити съ многобройни жлѣзисти власинки и съ по-рѣдки, слаби шипове. Въ околноститѣ на Черепишкия манастиръ. Сжщия видъ е намѣренъ у насъ на много други мѣста: Бирова (Пан.), Разградъ (Вел.), Камчия (Борн.), Софийско поле (Шк., Вел.), въ Витоша (Вел. и Виз.), надъ Дермендере (Вел.), Бургазъ, Текира (Вел.), Варна (Стр. Т.), Търново и Ловечъ (Ур.).

Наб. Срѣща се въ сръдна и източна Европа. Този видъ има много вариетети, които споредъ Grépin²⁾ неумѣстно сж земенни като отдѣлни видове. Отъ кръстосваньето на този видъ съ *R. arvensis*, *R. canina*, *R. tomentosa*, *R. rubiginosa* и *R. sericum* сж произлѣзли разни хибриди, отъ които голѣма частъ сж описани като отдѣлни

¹⁾ За да бѣдатъ свѣдѣнията за розитѣ по-пълни, споменувамъ въ статията сж всички находища на досега намѣренитѣ въ България видове.

²⁾ *Tableau analytique des roses européennes* (Comptes-rendus des séances de la Société R. de Belgique, 1 Mai, 1892.

видове. Споредъ сѣщия авторъ *R. centifolia* не е освѣнъ варietetъ на *R. gallica*.

Rosa pimpinellifolia D. C. Обикновено този типъ има прости листни забци, съ дръжчици гладки или четинесто-жлъзисти (*R. spinosissima*). Въ по-рѣдки случаи забцитѣ сѣ сложно-жлъзисти, въ долната страна на листовцитѣ слабо снабдени съ жлъзици (*R. Ripartii* Desegl.) или обилно снабдени съ жлъзици (*R. myriacantha* D. C.). Вънчолнстчетата бѣли, излека обагрени желто въ основата. Стълбчетата свободни помежду си, по-къси отъ тичинкитѣ. Кълбесто-меснатитѣ плодове ставатъ червено-рѣждави при узрѣването. Отъ кръстосването на този типъ съ *R. Alpina*, *R. canina*, *R. sericum*, произлизатъ множество хибриди, носещи специфични названия: *R. rubella* Sm., *R. reversa* W., *R. armatissima* Dés., *R. garpensis* Gren. и пр.

Твърдѣ разпространено по планинскитѣ голи върхове по Родопитѣ. Сѣщиятъ видъ е намѣренъ всждѣ почти по сухитѣ и лѣсисти низки хълмове въ цѣла България (Вел.), въ Търновско и въ Ловченско (Ур.).

Наб. Срѣща се въ Европа и Азия.

●*R. Alpina* L. Срѣща се по гориститѣ склонове на Шипковица и по Кобирино бранище край пътя отъ Рилския манастиръ за Сръбско село. Подъ Елени връхъ. Между Бѣли Искъръ и Чамъ кория. Въ гориститѣ мѣста до Чадъра надъ р. Бистрица (Геор.), Три чуки (Пан.), Витоша и Рила (Пан. и Вел.).

Наб. Европа.

Този типъ прѣдставя множество форми, отъ които извѣстно число сѣ въздигнати въ видове. Кръстосва се съ *R. pimpinellifolia*, *R. pomifera*, *R. tomentosa*, *R. coriifolia*, *R. glauca*, *R. rubrifolia*, за да произведе многобройни хибриди.

***Rosa pomifera* Herrm. Отдѣлнитѣ листчета сѣ снабдени по края съ жлъзисти рѣсници, обагрени въ розово-червеникавъ цвѣтъ; листята сѣ сиво-зелени и длъгнесто-ланцетни или длъгнесто-айцевидни; раздѣлитѣ на непадливата чашка сѣ сближени помежду си и речи правостоещи на върха на едрия кълбестъ, обвисналъ и твърдѣ бодливъ плодъ; шипове има твърди, шиповидни съ широка сплесната основа. Цвѣтнитѣ дъна (цвѣтоложетата) обикновено сѣ голѣми, изпълнени съ остри жлъзисти власинки, рѣдко гладки. Различава се отъ *R. tomentosa* по плодетѣ си, които ставатъ мѣснати щомъ узрѣятъ. Този видъ намѣрихъ въ Рила.

Наб. Европа, Азия.

Споредъ *Crépin* не трѣба да се смѣта *R. romifera* като видъ различенъ отъ *R. mollis*, понеже въ сжщностъ нѣма особна и строга разлика между тѣхъ; ето защо той е на мнѣние двата вида да носятъ общото название *R. villosa* L.

R. tomentosa Sm. Цвѣтни дръжчици обикновено дългнести; чашелистчетата обърнати назадъ слѣдъ разцвѣтяванъето, или изострени или изправени и съставлящи дълго врѣме вѣнецъ на цвѣтното дѣно. Листа обикнов. блѣдо-зелени. Листета отъ 5—7, яйцевидни или дългнести, двойно остро назъбени. Цвѣтове розови, обикн. блѣди, рѣдко ярко-розови. Плодове кълбести, червени при узрѣванъето, но меснати едва подиръ първитѣ мразове. Доста голѣмъ храстъ. Намѣрихъ го въ Рила, Рилския манастиръ, Черепишкия манастиръ. По-рано намѣрено на Три чуки (Пан.), Витоша (Ше., Вел.) и Рила (Вел.).

Наб. Европа, Азия.

Този типъ, твърдѣ различенъ и твърдѣ постояненъ въ характернитѣ си черти, прѣдставя нѣкои и други видоизмѣнения, на които сж били дадени специфични названия (*Cr.*).

*****R. glutinosa* Sibth. et Sm.** Шипове прави, рѣдко джговидни или слабо кукести, примѣсени съ многобройни иглици и жлѣзисти власинки, разположени по стеблото, клонитѣ и клонкитѣ; листетата сж обилно снабдени съ жлѣзици и отъ двѣтѣ страни; чашелистчетата се доближаватъ прѣзъ врѣме на зрѣянъето и окапватъ твърдѣ късно. Дребенъ храстъ. Обикновено шиповетѣ на този видъ сж доста прави, по което лесно се отличава отъ другитѣ видове отъ подотдѣла *Rubiginosae*. *R. pulverulenta* M. B. и *R. pustulosa* Bertol. сж прости синоними на *R. glutinosa*.

Ново за България. Рила.

Наб. Европа, Азия.

R. rubiginosa L. Шипове силно закривени, често пѣти въ долната или срѣдна частъ на стеблото примѣсени съ четинести шипове. Цвѣтодръжки доста дълги, речн като цвѣтното дѣно. Листа поврнати обикн. съ възчервеникави морави жлѣзици. Листета отъ 5—7 на брой. Миризливитѣ и цвѣтове сж ярко-розови, обик. усамотени. Храстъ високъ отъ 1—2 метра.

По низкитѣ склонове на Витоша и надъ Дермендере (Вел.).

Наб. Европа (особно въ срѣдна Ев.; въ южнитѣ Европейски страни се срѣща по-рѣдко, намѣстѣ дори съвсѣмъ липсува; не достига и сѣверъ). II този типъ прѣдставя множество видоизмѣнения отъ които нѣкои носятъ специфични названия: *Rosa comosa*

Rip., *R. apricorum* Rip., *R. echinacarpa* Rip., *R. umbellata* Plur auct., *R. dolorosa* Déségl et Ozan. и пр.

R. dumetorum Th. Листа опашати, покрити съ жлъзисти власинки; листета тъсни на двата края, покрити отъ едната или отъ двѣтъ страни съ миризливи, об. възчервеникави жлъзици. Цвѣтни дръжки гладки. Рила (Пан.), Витоша (Шк.).

*****R. coriifolia* Fries.** Листа мъшести, поне по срѣдния нервъ, меко-вожести, безъ жлъзи; младитѣ сж покрити и отгорѣ и отдолу съ сиво-бѣли власинки; отсетнѣ горната частъ става гладка; цвѣтове има ярко-розово-червени; кълбеститѣ и плодове стожатъ на вѣси плодни дръжки; чашелистчетата оставатъ на върха на плода до узрѣването му. Шипове сърповидни, при основата си разширени, слабо сплескани.

Намѣрихъ го въ Рила въ съдружие съ *R. pomifera*.

Hab. Европа (сѣвернитѣ страни, както и по планинската частъ на срѣдна Европа; въ най-южнитѣ ѣ части много рѣдко или досущъ липсува), Азия.

Споредъ Сгѣрин, този планински видъ произлиза отъ *R. canina* и не е освѣнъ мъховито състояние на *R. glauca*; прѣдставя множество видоизмѣнения, отъ които нѣкои сж въздигнати до видове.

*****R. glauca* Vill.** Шипове повече или по-малко силно кукести; листета яйцевидни, повече или по-малко заострени; дръжки обикновено твърдѣ вѣси, твърдѣ рѣдко четинесто-жлъзисти.

Въ Рила, до Рилския манастиръ заедно съ *R. pomifera*.

Изглежда да има сжщото географско разпространение както *R. coriifolia*. Много отъ видоизмѣненията му сж описани като отдѣлни видове: *R. falcata* Pug., *R. Crepiniana* Déségl., *R. discreta* Rip., *R. Nailstoni* Baker., *R. stephanocarpa* Rip. и пр.

*****R. micrantha* Sm.** Шиповетѣ ѣ никога не сж промѣсени съ жлъзисти иглици; листетата не сж жлъзисти отдолу; стълбчета обикн. голи (гладки).

Въ околноститѣ на София.

Hab. Европа (на сѣверъ липсува) Азия, Африка. Прѣдставя многобройни видоизмѣнения, отъ които нѣкои и други въздигнати въ видове: *R. permixta* Déségl., *R. nemorosa* Libert. *R. operta* Pug., *R. Lemanii* Bor., *R. lactiflora* Déségl. и др.

*****R. micrantha* Sm. var?** Интересна форма, що събрахъ въ Рила и въ околността на Чамъ-кория.

*****R. serpium* Thuill.** Листца елиптически или тѣснояйцевидни, стѣснени въ основата, съ многобройни жлъзици между второстепен-

нитѣ неври; дръжчици има дългнести; стебла високи, покрити съ шипове на известно разстояние едни отъ други.

Въ околноститѣ на Черепишкия манастиръ.

Наб. Европа. Има приблизително същото разпространение както *R. micrantha*, съ тая разлика, че достига малко по на сѣверъ. Африка.

Този видъ, чието първоначално название е *R. agrestis* Savi, прѣдставя множество видоизмѣнения, отъ които най-важнитѣ сж получили специфични имена: *R. vinodora* Kern., *R. belnensis* Ozan., *R. virgultorum* Rip., *R. mentita* Déségl и др.

Rosa canina L. У насъ този видъ е твърдѣ разпространенъ.

Наб. Срѣща се въ Европа, сѣверна Африка и западна Азия. Въ обширната своя арея прѣдставя множество вариетети, отъ които, споредъ Сегрѣн, неоснователно сж създадени много видове. Отъ тия видоизмѣнения у насъ намѣрихъ слѣднитѣ:

**А. Видоизмѣнение отъ групата *R. lutetiana* Lem. Листета гладки. Листни жбци прости. Дръжки гладки. Околноститѣ на София, Рила, дефилето на Искъръ, Черепишки манастиръ.

**В. Отъ групата *R. dumalis* Bechst. (*R. Cladoleia* Rip.) Листнитѣ жбци двойни или сложни и жлѣзисти. Второстепеннитѣ нерви безъ жлѣзици. Дръжки гладки.

Рила, Черепишки манастиръ, околноститѣ на София.

С. Отъ групата *R. dumetorum* Thuill. Листета мъшести поне на срѣдния нервъ. Прости листни жбци. Гладки дръжки.

Рила.

R. mollissima Wild. По гориститѣ мѣста надъ Сухо езеро край пѣтя отъ Самоковъ за Рилския манастиръ, Родопитѣ и Рила (Геор.).

Spiraeaceæ D. C.

●*Spiraea Ulmaria* L. По върха Бешулакъ и по Синиръ-тепе.

S. Filipendula L. Всждѣ по влажната мѣстность Глухи-върхъ на Бешулакъ. Вѣроятно и на други мѣста въ Родопитѣ.

Onagrarieæ Juss.

Epilobium hirsutum (E. amplexicaule Lam.). На много мѣста въ Родопитѣ край водата, въ долинитѣ и др.

E. parviflorum Schreb. (*E. pubescens* Rth., *E. molle* Lam.). Около Студена вода, въ влажнитѣ мочурливи мѣста въ гората.

**E. montanum* L. По гориститѣ поли на Синиръ-тепе; въ джбравата въ Дръновското и Бѣлишкото дерета. По влажнитѣ усойни

мѣста до Студената вода надъ Новаково; въ клисурата между Пещера—Батакъ и др.

Circea Lutetiana L. До Студена вода надъ Новаково, всждѣ по влажнитѣ сѣнчести мѣста въ гората.

Cucurbitaceæ Juss.

Bryonia alba L. Покрай храсталацитѣ, както и по влажнитѣ мѣста въ Новаково, Караджиларъ, Душка-дере, между Хасковскитѣ бани и Горно-Брѣстово и др.

Paronychieæ S^t Hil.

Herniaria incana Lam. (H. macrocarpa Sibt.). На много мѣста по скалитѣ въ Родопитѣ.

H. hirsuta L. По трѣвиститѣ неразработени мѣста въ Босилеградско.

Scleranthæ Lk.

Scleranthus perennis L. По скалитѣ между Караджиларъ и Сърнъчъ, недалечъ отъ нашия пограниченъ постъ.

● *S. marginatus* Guss. (*S. neglectus* Roch.). По Кобилино бранище.

Crassulaceæ D. C.

Sedum album L. По канаритѣ въ мѣстността Чешмата и Крайце недалечъ отъ Дрѣново.

● *S. repens* Schleich. (*S. alpestre* Vill). По Кобилино бранище.

S. acre L. По сухитѣ канари между Ерѣ-кьоприя и Шилденски камѣкъ.

S. Ceraea L. (*S. tetraphyllum* S. S., *S. galioides* All.). По сѣнчеститѣ лѣсисти склонове въ Гашна-дере и Шарлакѣ-дере.

S. glaucum W. K. (*S. hispanicum* L.). По канаритѣ въ държавната гора „Тиклата“, не далечъ отъ Тополово. Образува голѣми гнѣзда. Сѣция видъ намѣрихъ и по скалитѣ между Лѣкавица и Крушово.

S. Caespitosum D. C. (*Crassula Magnolii* D. C.) Този видъ намѣрихъ по скалиститѣ върхове на югъ отъ Тополово. Рѣдко растение за България, намѣрено до сега само отъ Вел. около Пазарджикъ.

Saxifragaceæ D. C.

Saxifraga Aizoon Jcq. Въ пукнатиянитѣ на скалитѣ по Коби-
лино бранище.

●*S. Aizoon* Var. *orbelica*. Този новъ варietetъ намѣрихъ
въ 1900 г. въ пукнатиянитѣ на стрѣмнитѣ скали недалечъ отъ
Сухо езеро. Г. Velenovsky, който за прѣвъ пѣтъ направи съоб-
щение за него въ „Oesterreichische botanische Zeitschrift“, Jahrg.
1901, № 1 — Achter Nachtrag zur Flora von Bulgarien, прави
слѣднитѣ бѣлѣжки: листата му сж малко по-дълги, тѣпозаострени.
Съцвѣтие сгъстено. Самото растение е по-малко разклонено; на
всѣко разклонение стоѣтъ обикновено 1—2 цвѣта. Цвѣтоветѣ и
плодоветѣ му сж по-едри, нежели на вида. Чашката му е повече
жлѣзиста. Доста буйно.

S. porophylla Bert. (*S. thessalica* Schot., *S. Friderici Augusti*
Bias. По варовититѣ скали на Бачковския манастиръ.

●*S. rotundifolia*. Въ влажнитѣ и крайпоточни мѣста по висо-
китѣ Родопски върхове.

Umbelliferæ Juss.

Orlaya grandiflora Hfm. На много мѣста въ Родопитѣ.

Ferulago sp. По пѣтя отъ Караджиларъ за Сърнѣчь. Не е
много обикновено.

Pastinaca hirsuta Panč. Fl. Serb. 1874. Между високитѣ ли-
вади на Бешулакъ, между Павелско и Дрѣново (Крайща, Голѣмитѣ
ливади, Циганецъ и др.) За описанието на този видъ вж. Fl. blg.
стр. 208.

Libanotis montana All. По голитѣ скали на Сухо езеро.

Conium maculatum L. Всждѣ по влажнитѣ сѣнчести мѣста по
политѣ на Родопитѣ. Особно много въ запустеното с. Форцово.

Phisospermum aquilegifolium Koch. По сѣнчеститѣ гористи мѣста
между Югово и Павелско.

Eryngium campestre L. Покрай пѣтищата и пасбищата.

Astrantia major L. По южнитѣ склонове на Бешулакъ, а именно
въ мѣстността Сждѹла, Крайща и др.

Araliaceæ Juss.

Hedera Helix L. По сѣнчеститѣ скалисти мѣста около Бач-
ковския манастиръ; по върха св. Георги надъ с. Дрѣново; въ

Дрѣновското дере; между Лжавица и Крушово; изобщо всждѣ по низкитѣ Родопски пояси.

Cornеѡ D. C.

Cornus mas L. По гориститѣ мѣста всждѣ изъ Родопитѣ по по-низкитѣ мѣста: Бачковско, Бѣлишко, между Шипковица и Форцово и др. Стари дрѣнови дървета видѣхъ въ Душка-дере, на границата.

Caprifoliaceѡ Rich.

Viburnum Lantana L. Въ Люти-долъ. Вѣроятно и другадѣ.

Sambucus Ebulus L. Покрива цѣли пространства между Караджиларъ и Сърнѣчь, особно по политѣ на Шафрана, св. Илия, Кьомюрджи-тарла.

Lonicera Xylosteum L. Въ околността на Югово.

Rubiaceѡ Juss.

**Galium rubioides* L. (*G. articulatum* Lam.) По сухитѣ варовити скали по течението на Дрѣновската рѣка.

**G. Schultesii* Vest. До сега този видѣ бѣ намѣренъ само до Ихтиманъ отъ Formánek. Азъ го събрахъ въ джравата между Бѣлица и Ерѣ-кюприя. Намѣрихъ го така сжщо въ гората между Караджиларъ и Сърнѣчь.

G. Verum L. Край шубръцитѣ и трѣвиститѣ мѣста по политѣ на Гора, Анатимитѣ, Кълки и др. Всждѣ разпространено.

G. aureum Vis. Всждѣ по склоноветѣ между Чуката и Лжавица, между Югово и Павелско. Срѣща се тѣй сжщо въ Люти-долъ, по Кълки, Анатимитѣ и др.

G. Aparine L. На много мѣста въ по-низкитѣ пояси на Родопитѣ, главно въ храсталацитѣ.

G. Cruciata Scop. Тамъ, дѣто се срѣща и горното.

G. alpinum Schur. По Родопскитѣ височини, Хундулу-махале, Аланъ-дере, Гашна-дере, по политѣ на Чаль-тепе, Орманово, Фотинската рѣка и пр. Вж. Fl. blg. стр. 236.

Asperula arvensis L. Всждѣ по низкитѣ поли на Родопитѣ.

Asperula odorata L. Между Станимака и Югово, въ мѣстността Двѣтъ ханчета.

**Ach. flaccida* Ten. По варовититѣ стрѣмни склонове въ Дръновското дере. Срѣща се тѣй сѣщо по скалитѣ между Караджиларѣ и Сърнѣчѣ.

A. cunanchica L. По скалитѣ между Югово, Павелско, Анатимитѣ, Гора и пр.

Valerianae D. C.

Valeriana officinalis L. По трѣвиститѣ влажни, неразработени мѣста на Синирѣ-тепе.

Dipsacae D. C.

Scabiosa ochroleuca L. subs. *rhodopea* Vel. 1894. Изъ джбравата по течението на Бѣлишката рѣка и по Синирѣ-тепе. (За дигнозата вж. Fl. blg. Sup. ст. 146).

**Scabiosa silaifolia* Vel. 1886. Между Караджиларѣ и Сърнѣчѣ покрай пжтекитѣ въ гората. Този новъ видъ на Vel. до сега не бѣ намѣренъ въ Родопитѣ. Вж. Fl. blg. 244.

S. Ucranica L. Между Фотинѣ и Форцово, по голитѣ трѣвисти поли на Чалѣ-тепе, по Шипковица и Аланѣ-дере.

Knautia orientalis L. (*K. proprontica* L.) Тукъ тамъ по политѣ на Драгойна. Гл. Fl. blg., Sup. 148.

K. argensis L. Доста разпространено по сухитѣ неразработени мѣста между Югово—Павелско.

●*K. magnifica* Boiss. По алпийскитѣ поляни между Рилския манастирѣ и Сухо езеро.

Compositae L.

Senecio vernalis W. K. (*S. peduncularis* Grsb. Spic., *S. crassifol.*, Fl. Gr.). Всѣдѣ разпространено въ гората между Лжкавица и Крушово.

●*S. nemorensis* L. (*S. Jacquinianus* Rchb., *S. octoglossus* D. C.). Въ влажнитѣ мѣста изъ гората с.-з. отъ Студена вода надъ Новаково.

Anthemis tinctoria Neuff. Тукъ-тамъ по неразработенитѣ мѣста въ подножието на Родопитѣ.

A. montana L. Между Югово и Павелско.

A. ruthenica M. B. Между Пещера и Батакъ.

A. gaudium solis, sp. n. Този новъ видъ на Vel. е намѣренъ пръвѣ пжтъ отъ Стр. прѣзъ 1897. г. близу при Скобелево. Азъ

го събрахъ по изложенитѣ на припекъ скали по пътя отъ Бачковския манастиръ за Югово. Вж. Sup. ст. 152. Твърдѣ обикн. между Fl. blg., Караджиларъ и Сърнъчъ.

Achillea Millefolium L. Достига голѣми височини по Родопитѣ. Въ изобилие въ гората между Синиръ-тепе и Крушово. Расте прѣимуществено по трѣвисти неработени мѣста.

A. setacea W. K. Люти долъ. Карамъшъ. Между Пещера и Батакъ и пр.

Achillea odorata Koch. Synop. p. 436. Покрива цѣли пространства по камениститѣ склонове на в. Драгойна. Сжщиятъ видъ се срѣща до с. Югово заедно съ *Achillea Vandasii* Vel.

A. Vandasii Vel. Този новъ за България видъ, намѣренъ пръвъ пѣтъ отъ Velenovsky надъ Драгоманъ въ 1890., събрахъ до с. Югово, (Вж. Fl. blg., 265.).

A. compacta Willd. По ридовѣтъ и сухитѣ мѣста между Дупница и Рила, Узунъ-дере и Хасковскитѣ бани.

A. pseudopectinata Jka. Между Станимака и Югово. Сжщия видъ намѣрихъ по горния пѣтъ отъ Дупница за с. Рила. (Вж. Fl. blg., 267.).

Tanacetum vulgare L. Всждѣ по политѣ на Родопитѣ.

P. corymbosum W. (L.). Всждѣ изъ джбовата гора между Фотинъ и Форцово, около Шипковица и др. По склоновѣтъ на Гора, Анатимитѣ, въ Люти-долъ и пр. Екземпляритѣ отъ подирната мѣстность сж по-дребни. Въ ливадитѣ подъ Пашалийската гора, недалечъ отъ Дрѣново и по пѣтя между Бачковския манастиръ и Югово. (Вж. Fl. blg. ст. 269.).

P. Parthenium Sm. По мочурливитѣ сѣнчести мѣста въ гората между Караджиларъ и Сърнъчъ. Обикновено по течението на Бѣлишката рѣка. Сжщиятъ видъ се срѣща между Пещера и Батакъ.

● *P. macrophyllum*, forma W. K. (*Achillea sambucifolia* Dsf.). По сѣнчеститѣ влажни мѣста въ мѣстността Кълки между Югово и Павелско.

Chamaemelum trichophyllum Boiss. (*Chrysanthemum* Kit.). Въ мѣстността Голѣмитѣ ливади, Циганецъ, Крайщата и пр. (Вж. Fl. blg., ст. 271.).

Artemisia scoraria W. K. По скалиститѣ склонове въ клисурата между Пещера и Батакъ.

A. vulgaris L. По неработенитѣ мѣста.

A. Absinthium L. Около селата въ подножието на Родопитѣ.

●*Gnaphalium dioicum* L. (*Antennaria dioica* Gaertn., *G. alpina* C. A. M.). По височинитѣ между Чарка въ Еланъ-дере и Шипковица, Шарлакъ-дере. Сжщото растение по-рано намѣрихъ на Кобилино бранище.

Filago argvensis L. По неработенитѣ мѣста и по хълмоветѣ всждѣ почти по низкитѣ Родопи. На много мѣста въ нивитѣ между Тополово и Сърнъчъ.

Erigeron acris L. По варовититѣ голи скали надъ Тополово.

E. canadense L. По трѣвиститѣ мѣста, по нивитѣ, край пѣтищата, както и по неработенитѣ мѣста по политѣ на Родопитѣ.

*●*E. Willarsii* Bell. (*E. atticum* Vill.). Този рѣдъкъ за България видъ намѣрихъ въ Шарлакъ-дере, до р. Сушица. Въ 1897. г. сжщия видъ намѣренъ отъ Стрб. на върха Мусалла.

●*Telekia speciosa* Bmg. (*Bupthalmum cordifolium* Kit., *T. ovata* C. K.). Покрива цѣли пространства въ мѣстността Св. Георги и Краища, до чешмата недалечъ отъ помашкото с. Дрѣново. Срѣща се тѣй сжщо въ изобилие между Синиръ-дере и Крушово въ влажнитѣ усойни долчинки.

Jnula ensifolia L. Всждѣ по склоноветѣ на Гора, Анатимитѣ и др., между Югово и Павелско.

J. Conyza D. C. Между Станимака и Югово по гориститѣ сѣнчести мѣста, както и въ клисурата между Пещера и Батакъ.

J. Aschersoniana Jka. Въ пукнатинитѣ на варовититѣ скали въ Дрѣновското дере. Още не бѣ се разцвѣнало добрѣ на 9. юли. (Вж. Fl. blg. 283.).

Eupatorium cannabinum L. Въ усойтѣ и крайпоточнитѣ мѣста въ Узунъ-дере.

Petasites officinalis Mch. Въ много отъ Родопскитѣ долини, по край поточнитѣ мѣста.

P. albus L. Въ усойтѣ на Люти-долъ и въ сѣнчеститѣ крайводни мѣста въ клисурата между Пещера и Батакъ.

Tussilago Farfara L. По пѣтя между Станимака и Югово по влажнитѣ мѣста. Вѣроятно и другагѣ.

**Echinops banaticus* Roch. Вредъ изъ джбравата по пѣтя отъ Сърнъчъ прѣзъ Узунъ-дере за Хасковскитѣ бани.

Xeranthemum annuum L. Всждѣ почти по неработенитѣ мѣста и край синоритѣ на нивитѣ.

Onopordon Acanthium L. Въ храсталацитѣ на много мѣста по низкитѣ Родопи.

Cirsium sanum M. B. Между Батакъ и Нова махала по влажнитѣ сѣнчести мѣста.

Carduus acanthoides L. По течението на Бачковската рѣка, въ Узунъ-дере, около Хасковскитѣ бани и пр. Всждѣ разпространено.

Serratula tinctoria L. По трѣвиститѣ мѣста между Батакъ и Нова-махала.

**Centaurea Jacea* L. Всждѣ по изложенитѣ на припекъ мѣста по пѣтя между Сърнѣчь прѣзъ Узунъ-дере за Хасковскитѣ бани.

C. stenolepis Kerner. По пѣтя между Нова-махала и Фотинѣ. Срѣща се и по изложенитѣ на припекъ мѣста между Козлукъ и Карааланъ, както и по ливадитѣ между Павелско и Дрѣново.

**C. Gheorghieffii* Halacsy, Oest. B. Z. 1891. Между Караджиларъ и Сърнѣчь. Моитѣ екз. сж по-едри отъ намѣренитѣ на Юмручалъ. (Вж. Мсб. V, ст. 319. Родопитѣ и пр. отъ Ст. Георгиевъ).

C. Cyanus L. По нивитѣ на много мѣста по политѣ на Родопитѣ. (Fl. blg. 308.).

**Centaurea maculosa* Lam. (*C. paniculata* M. B.) !По сухитѣ на припекъ изложени мѣста по върха Драгойна покрива цѣли пространства, на които придава хубавъ бѣль колоритъ. Сжщиятъ видъ се намира между Павелско и Дрѣново и по Синиръ-тепе. Расте прѣимуществено по варовитѣ теренъ.

C. stereophylla Bess. По трѣвиститѣ и сухи мѣста по пѣтя отъ Бачковския манастиръ за Югово. Нѣкои екз. достигатъ повече отъ 80 с. м. височина.

C. Salonitana Vis. (*C. latisquama* D. C. и пр.). По пѣтя между Козлукъ и Карааланъ по сухитѣ открити мѣстности. (Вж. Fl. blg., 324.).

Centaurea solstitialis L. Изъ нивитѣ, по пасбищата и пр. на много мѣста въ подножието на Родопитѣ.

Sonchus uliginosus M. B. (*S. Nymani* Tin.). По влажнитѣ сѣнчести мѣста между Станимака и Югово. (Вж. Fl. blg., ст. 328.).

Lactuca muralis Frees (*Mucelis mur.* Rchb.). Доста разпространено по влажнитѣ, усойни мѣста въ гората между Караджиларъ — Куру-чешме, по Кьомюрджи-тарла и около Сърнѣчь. Срѣща се и по сѣнчеститѣ лѣсисти склонове на Синиръ-тепе. Споредъ Геор. този видъ се срѣща нарѣдко въ Чепинско (Фл. ю. Бълг. 227.).

●*Prenanthes purpurea* L. Тукъ-тамъ по сѣнчеститѣ гористи мѣста на с.-з. отъ Студена вода надъ Новаково.

**Chondrilla juncea* L. По изложенитѣ на припекъ мѣста между Карааланъ — Караджиларъ.

Taraxacum officinale Web. На много мѣста по политѣ на Родопитѣ, особно по пасбищата и пр.

Crepis foetida L. По пѣтя между Козлукъ и Карааланъ.

Hieracium Pilosella L. По полянитѣ и сухитѣ неразработени мѣста по Рила.

Hieracium sp. Въ сѣнчеститѣ мѣста на с. з. отъ Студената вода.

Hieracium sp. Доста нарѣдко въ джбравата между Караджиларъ и Сърнъчъ, недалечъ отъ нашия пограниченъ постъ.

Tragopogon patense L. (T. minus Fr.) Всждѣ по ливадитѣ между Югово и Лжковица.

Scorzonera Jasquiniana K. Между Хасковскитѣ бани и Горно-Брѣстово.

Leontodon hastilis L. Тукъ-тамъ въ Дрѣновското дере, по влажнитѣ мѣста.

Hypochaeris maculata L. Обикновено по ливадитѣ между Павелско и Югово.

Scolymus hispanicus L. Доста обикновено по низкитѣ склонове на Родопитѣ.

Chichorium Intybus L. По синоритѣ на нивитѣ, по ливадитѣ край пѣтищата всждѣ по политѣ на Родопитѣ.

Ambrosiaceæ Lk.

Xanthium spinosum L. Всждѣ почти въ подножието на Родопитѣ.

X. strumarium L. Прѣимуществено се срѣща по влажнитѣ и крайпоточни мѣста въ подножието на Родопитѣ.

Campanulaceæ Juss.

Campanula Vulutina Vel. 1890. Въ пукнатинитѣ на кристалинитѣ шисти въ Синиръ дере до моста. Много повече се срѣща въ клисурата между Пещера—Батакъ; тукъ то покрива цѣли скали; прѣзъ втората половина на юлия бѣ въ пълния си разцвѣтъ. (За описанието на тоя видъ вж. Vel., Fl. blg, ст. 365 и Sup. ст. 183.).

●*Campanula orbelica* Panč, Elem. 1886 (*C. arpinà* Vel. olim). По Кобирино бранище. (За подробности гл. Fl. blg., ст. 367).

C. glomerata L. (*C. aggregata* Wlld.) Всждѣ по лѣснитѣ поли на Бешулакъ между Павелско и Дрѣново. Вѣроятно и по другитѣ Родопски височини.

C. rapunculoides L. (*C. cordifolia* C. K.) Въ сѣнчеститѣ гористи мѣста на с. з. отъ Студена вода.

C. persicifolia L. Въ храсталацитѣ и сѣнчеститѣ мѣста всждѣ между Югово и Лжковица.

Campanula persicifolia L. var. *sessiliflora* C. K. (*C. latiloba* D. C., *C. grandis* F. M.) Всждѣ по Анатимитѣ, Гора, Кълкитѣ и пр. Нѣкои екземпляри достигатъ повече отъ 80 с. м. Всждѣ по ливадитѣ на Бешулакъ. По-рано го намѣрихъ и по Кобилино бранище. По Веленовски този сортетъ е обикновенъ по склоноветѣ на Родопитѣ. (Fl. blg., Sup. 185.).

C. patula L. По трѣвиститѣ мѣста между Дупница и с. Рила.

C. moesiaca Vel. 1892. Този новъ видъ на Вел. намѣрихъ въ влажнитѣ мѣста на с. з. отъ Студена вода. — Стебла 30—50 с. м. високи, долнитѣ листа 10—15 с. м. \times 4—6 с. м. (За подробности вж. Fl. blg., Sup., ст. 184.

Podanthum canescens W. K. (*P. salignum* Bess.) По варовититѣ скали въ Гашна-дере.

Trachelium rumelicum Hmpe. Flor. 1837 (*Phyteuma rumel. Grisb. Spicil.*) Въ пукнатинитѣ на варовититѣ скали на Чуката. Стебла 15—25 с. м., листа 2—2 $\frac{1}{2}$ \times 1 $\frac{1}{2}$ с. м., щитче 2—2 $\frac{1}{3}$ с. м. широко, вѣнче дълго 12 м. м., кутийка 2 $\frac{1}{2}$ —3 м. м. дълга. (За подробности вж. Fl. blg., ст. 373).

Jasione Heldreichii Boiss. Всждѣ по границата между Кюмюрджи тарла и Сърнъчъ, по изложенитѣ на припекъ мѣста. Срѣща се и въ Узунъ дере; по пѣтя отъ Тополово за Горно Арбанаси; въ джбравата по Бѣлишката рѣка. Стебла 30—50 с. м. високи, листа 1 $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$ с. м. \times 2—3 м. м., главичка 10—15 м. м. въ диам., чашечна тръбица 2 м. м. дълга. (За подробно опис. вж. Fl. blg., ст. 374 и Sup., ст. 188).

Bicornes L.

●*Bruckenthalia spiculifolia* Rchb. По най-високитѣ Родопски чуки и върхове. Намѣстѣ покрива цѣли пространства по алпийскитѣ поляни, и имъ придава особенъ червеникавъ колоритъ (вж. Fl. blg., ст. 376.)

●*Vaccinium Myrtillus* L. На върха Синиръ-тепе. Въ твърдѣ голѣмо изобилие се срѣща и по мѣстността Тилкили-махала, около нашия пограниченъ постъ; намира се и по височинитѣ между Нова-Махала и Фотинъ, особно къмъ каракачанскитѣ колиби и др.

●*V. Vitis idaea* L. По голѣмитѣ Родопски височини заедно съ горнитѣ.

Pyrola rotundifolia L. Между Фотинѣ и Тилкили по върха Ески-Юртъ между Шанкая и Чалъ-тепе.

P. Secunda L. (*Ramischia* sec. Op.). По пѣтя между Ерѣ-Кьоприя и Тополово, изѣ джбравитѣ.

Ebenaceæ Vent L.

**Diospyros Lotus* L. Два екземп. отъ това рѣдко за България дърво се намиратъ въ Бачковския манастиръ. Едното е въ манастирския дворъ и достига близу 20—25 метра височина, а другото е извънъ манастирската ограда. Плодоветѣ изпърво сж зелени, нѣ послѣ пожелтаватъ и най-сетнѣ почерняватъ и зрѣятъ прѣзъ декемврия м. Нѣкои ги ядѣтъ. Отееството на това дърво вѣроятно е Кавказъ и сѣв. Китай. Въ нѣкои страни култивиратъ извѣстни видове *Diospyros*, за меснатитѣ имъ вкусни плодове. Дървото на видоветѣ отъ този родъ се цѣни поради голѣмата си твърдостъ и приятния си черъ цвѣтъ (абаносово дърво).

Jasmineæ Br.

Jasminum fruticans L. Между Югово и Павелско, Кръчимъ и Перущица и др.

Oleaceæ Lindl.

Syringa vulgaris L. По политѣ на Анатимитѣ между Югово и Павелско, въ Дрѣновското дере, по Бѣлишката рѣка и пр. Срѣща се до 800 м. височина.

Fraxinus Ornus L. По височинитѣ на ю. отъ Тополово; по источнитѣ поли на в. Баба, а още повече къмъ Югово. По политѣ на Анатимитѣ и Гора, до 800 метра високо. Срѣща се така сжщо и по политѣ на Родопитѣ между Тополово и Новаково. Въ подирното село му казватъ *мажрявка*, отъ дѣто навѣрно си е добилъ названието *мажряковъ връхъ* — височината лежеща на ю. из. отъ пѣтя, що води отъ Новаково за Караджиларѣ. Между Тилкили и Форцово по нарѣдко се срѣща. Изобщо изобилствува изѣ листнатитѣ гори по Родопитѣ.

F. excelsior L. Въ държавната гора *Тиклата*, не недалечъ отъ Тополово по пѣтя къмъ с. Орѣшецъ. Срѣща се така сжщо всждѣ изѣ гората между Караджиларѣ и Сърнъчъ по самата граница, а

особно по политѣ на Шафрана, Св. Илия и Кьомюрджи тарла (Ель Гидикъ).

Gentianaceae (Juss.).

●*Gentiana punctata* L. Изъ ливадитѣ по Чалъ-тепе, близу до българския пограниченъ постъ.

G. cruciata L. Въ мѣстността Крачунъ, Гробето и въ Форцово.

●*G. asclepiadea* L. Изъ усойтѣ въ клисурата между Пещера — Батакъ.

G. Pneumonanthe L. По Чалъ-тепе, Синиръ-тепе, Бешулакъ, между Батакъ и Нова Махла — Фотинъ и пр.

●*G. utriculosa* L. Това рѣдко за България растение намѣрихъ по Кобирино бранище. До сега у насъ то е било намѣрено само отъ Панчичъ въ Витоша и отъ Reiser'a въ Родопитѣ.

●*G. pyrenaica* L. (*G. Djimilensis* C. K.). Срѣща се на често по влажнитѣ крайпоточни мѣста по високитѣ Родопски върхове. Има го и по Кобирино бранище.

Erythraea Centaurium Pers. По ливадитѣ между Козлукъ и Карааланъ. Доста разпространено и въ Дръновското дере.

E. pulchella Fr. Изъ мочурливитѣ, влажни и крайпоточни мѣста.

Cyrtandaceae Jack.

Haberlea rhodopensis Friv. 1835. Това рѣдко и характерно за флората на България растение събрахъ въ пукнатинитѣ на влажнитѣ варовити скали въ Дръновското дере. Срѣща се и по канаритѣ въ клисурата между Пещера и Батакъ. (Вж. Fl. blg., 386).

Convolvulaceae Vent.

Calystegia silvatica Chois. (*Convolvulus sylvestris* M. B.). Въ сѣнчеститѣ мѣста по пѣтя между Еръ-кьоприя и Тополово, по политѣ на Шилденски камъкъ въ дѣбравата. Същото събрахъ и въ Узунъ-дере и въ гората, като минешъ Душка-дере къмъ българския пограниченъ постъ до с. Сърнячъ. (Вж. Fl. blg., 287).

Convolvulus Canthabrica L. По изложениѣ на припекъ скалисти мѣста въ Дръновското дере. Сигурно и на други мѣста въ Родопитѣ.

C. hirsutus Ster. Между Бачково и Югово.

C. arvensis L. Всждѣ по политѣ на Родопитѣ.

Cuscuta europaea L. (*C. major* D. C.). Въ гората между Лжавица и Крушово.

Borragineae Juss.

Heliotropium europaeum L. Между Сърнъчъ и Хасковскитѣ бани.

Anchusa officinalis L. Въ околността на Сърнъчъ, въ Узунъ-дере и др. (Вж. Vel. Sup. 196).

Pulmonaria mollis Wolf. На много мѣста по низкитѣ Родопи.

Echium italicum L. Между Тополово и Новаково.

Echium vulgare L. Всѣждѣ между Бачковския манастиръ и Югово; по ливадитѣ между Павелско и Дръново; по политѣ на Чаль-тепе; по Мисимли, Шипковица, Фотенъ, Форцово и пр. Екземпл. събрани между Павелско и Дръново достигатѣ грамадни размѣри.

Alkanna primuliflora Grsb. Доста обикновено растение всѣждѣ по политѣ на Родопитѣ. (Вж. Fl. Bul. 400, Sup. 201).

Lithospermum officinale L. Въ храсталацитѣ по склоноветѣ на Гора, Анатимитѣ, между Чуката и Лжавица и пр. Достига до 80 см. височина.

M. silvatica Hoffm. Въ Гашна-дере и Еланъ-дере.

Solanaceae Bartl.

Datura Stramonium L. Обикновено по политѣ на Родопитѣ, Станимака, Бачково, Югово, Дръново, Бѣлища, Каръмъшъ, Тополово, Новаково, Карааланъ и пр. Срѣща се прѣимуществено по бунищата.

Nyoscyamus niger L. Около Бачковския манастиръ, Дръново, въ Дръновското дере, по Бѣлишката рѣка, Душка-дере, Пещера, Кръчимъ и др.

● *Atropa Belladonna*¹⁾ L. Доста разпространено около Студена вода, въ влажнитѣ усойни мѣста. Въ клисурата между Пещера и Батакъ видѣхъ екземплари, които достигатѣ близу човѣшки ръстѣ.

Physalis Alkekengi L. Въ клисурата между Пещера и Батакъ.

Solanum Dulcamara L. По влажнитѣ мѣста и край храсталацитѣ около Пещера.

S. nigrum L. Всѣждѣ обикновено по бунищата край селата.

¹⁾ Въ с. Новаково ми разказваха, че тамъ болятъ отъ ревматизмъ ядѣли плодетѣ на гуй растение, а коренитѣ му варѣли, та пиели водага; гуй тѣ се излѣкували отъ ревматизма, сѣдѣ като лудѣли прѣдварително въ продължение на 24 часа.

Personatae L.

Verbascum thapsiforme Schrad. По горния пътъ отъ Дупница за Рила.

Verbascum speciosum L. (*V. longifolium* D. C.). Въ мѣстността Сждули, Конско пладнище, Св. Георги, въ околността на Дръново и др.

V. Lychnitis L. По течението на Бачковската рѣка, по Анатимитѣ, Гора, Люти долъ, Кълки и др.

V. Bornmülleri Vel. 1889. Този новъ видъ на Vel. намѣрихъ въ Дръновското дере. (За подробното му описание вж. Fl. blg., 415 и Sup. 209).

**Digitalis laevigata* W. K. Слабо разпространено по политѣ на Анатимитѣ, Гора, въ Люти-долъ и др. До сега въ България този видъ бѣ намѣренъ отъ Панчича и Велен.

D. lanata Ehrh. (*D. Winteri* Roth.). Всждѣ между Бачковския манастиръ и Югово. Варира твърдѣ много.

D. viridiflora Lndl. Между Павелско и Дръново.

Linaria spuria Mill. По сухитѣ каменисти мѣста край царевитѣ по пѣтя отъ Карааланъ за Караджиларъ.

Linaria vulgaris L. Тукъ-тамъ на групи въ Узунъ-дере, около Сърнъчъ, и по пѣтя що води отъ Узунъ-дере за Хасковскитѣ бани.

L. genistaefolia Mill. Доста обикновено по неразработенитѣ мѣста между Лѣзвица и Крушово. Достига значителна височина.

L. sofiana Vel. 1886. Този новъ видъ на Vel. намѣрихъ по пѣтя между Козлукъ и Карааланъ.

Veronica Anagallis L. По мочурливитѣ сѣнчести мѣста на пѣти между Карааланъ и Караджиларъ, особно много до чешмата. Нѣкои екземпл. достигатъ до 50 см. височина.

V. bellioides L. По Кобилино бранище, около Сухо езеро.

V. serpyllifolia L. Намира се всждѣ почти по Родопитѣ.

Euphrasia officinalis (L.) Schk. По пѣтя между Тополово за манастира Св. Петка, прѣзъ Сушица.

Pedicularis leucodon Grsb. Между държавната гора Тиклата и с. Орѣшецъ.

Labiatae Juss.

Teucrium Chamaedrys L. Разпространено речн всждѣ между Югово и Крушово. Намѣстѣ покрива цѣли пространства. Расте прѣимуществено по сухитѣ и каменисти хълмове.

T. Polium L. Въ изобилие всждѣ по скалитѣ на мѣстността Дълга-усойка, между Бачковския манастиръ и Югово.

T. montanum L. По Анатимитѣ и Бешулакѣ.

Ajuga reptans L. Между Тополово и манастира Св. Петка до Станимака.

A. Laxmanii L. На много мѣста по Родопитѣ.

Salvia Sclarea L. Въ голѣмо изобилие по пѣтя отъ Югово за Павелско. Срѣща се и надъ 1000 метра вис.

S. amplexicaulis Rechb. Griseb. Образува отдѣлни острови по политѣ на Бешулакѣ между Павелско и Дръново. (За подробното описание вж. Fl. blg. 447).

S. verticillata L. По сѣщитѣ мѣста, дѣто се срѣща и *S. Sclarea*.

Scutellaria Pichleri Vel. Този видъ, намѣренъ прѣзъ 1890 г. отъ Pichler'a надъ Станимака и публикуванъ отъ Vel., намѣрихъ тукъ-тамъ по височинитѣ на с.-з. отъ Студена вода, като се отива за Тополово. Нѣкои отъ тия екз. съставятъ прѣходъ между *S. albidula* и *S. peregrina*. (Вж. Vel. Fl. blg., 449.)

Prunella alba Pall. (*P. Laciniata* L.). Всждѣ между Югово и Павелско, особно по Анатимитѣ, Гора, Кѣлки, въ Люти долъ, Блатата, по течението на Фотинската рѣка, въ Гашна-дере, по Шипковица, Форцово, Ясж-курия и др.

Lamium purpureum L. Между Пещера и Батакѣ.

Betonica officinalis L. По политѣ на Шафрана, Св. Илия, по Бѣомюрджи тарла, Душка-дере и пр., но не много разпространено.

Stachys angustifolia M. B. (*S. tenuifolia* Pall.). Въ мѣстността Хасаря, недалечъ отъ с. Караджиларѣ.

S. annua L. Всждѣ между Бачковския манастиръ и Югово, особно въ мѣстността Дълга усойка, Душковецъ, Плешивецъ и др.

Marrubium peregrinum Jscq. Срѣща се на много мѣста въ политѣ на Родопитѣ.

M. Frivaldskyanum Boiss. (*M. candidissimum* Friv.). По пѣтя между Югово и Павелско.

Sideritis montana L. Въ голѣмо изобилие по излюженитѣ на припекъ мѣста по Анатимитѣ, Гора, Кѣлки и др. между Югово и Павелско.

Nepeta rannonica Jscq. (*N. nuda* Auct.). Почти всждѣ по малитѣ височини между Павелско и Дръново. По сѣщитѣ мѣста намѣрихъ екз. съ бѣли цвѣтове — прѣходъ между *N. rannonica* и *N. nuda*. Въ изобилие сѣщия видъ, въ още по-едри екз. намѣрихъ

по лѣсиститѣ планински склонове надъ параклиса Св. Варвара до с. Павелско.

**N. nuda* Jsq. Въ Гашна-дере и Еланъ-дере, по пѣтя отъ Тилкили-махале за Форцово. До сега този видъ у насъ бѣ намѣренъ само до Сливенъ отъ Шкор. (За подробности на туй доста рѣдко растение вж. Fl. blg., 461).

Thymus humifusus Brnh. Около Сухо езеро на Кобилино бранище. Бълг. наз. *маторка* — Рил. м-ръ.

Mentha Pulegium L. На много мѣста въ Родопитѣ, по мочуритѣ и край водитѣ.

Primulaceae Vent.

Lysimachia punctata L. Край водитѣ между Фотинъ, Тилкили и Форцово, особно въ Гашна-дере, Еланъ-дере, Орманово, по сѣнчеститѣ мѣста между Бачковскии манастиръ и Югово и пр.

Anagallis arvensis L. Обикновено по течението на Дръновската рѣка.

Primula exigua Vel. 1886. Този новъ видъ отъ Vel. намѣрихъ по Кобилино бранище. (Описанието му е помѣстено въ Fl. blg., 478).

Plumbagineae Vent.

**Armeria rumelica* Boiss. (*A. alpina* Friv.). Всждѣ между Тилкили и Форцово, по течението на Фотинската рѣка. Юли и августъ.

Plantagineae Vent.

Plantago major L. По влажнитѣ и трѣвисти мѣста всждѣ почти изъ Родопитѣ.

P. media L. По трѣвиститѣ влажни мѣста въ Гашна-дере. Въ по-голѣмо изобилие сѣщия видъ намѣрихъ въ ливадитѣ въ мѣстноститѣ Тузлата, Локвата, Сѣдуля, Циганецъ, Голѣмитѣ ливади, Краища и др. между Павелско и Дръново.

P. lanceolata L. Всждѣ почти по ливадитѣ, особно по течението на Бѣлишката рѣка по пѣтя отъ Карамъшъ за Ерз-къоприя.

P. carinata Schrd. (*P. serpentina* Lam.). Всждѣ между Чарка въ Еланъ-дере и Шипковица. Варира твърдѣ много.

Polygonaceae Lndl.

Rumex sp. По пѣтя отъ Павелско за Дръново, въ мѣстността Гьолтъ, Ливадитѣ и др.

R. paluster Sm. въ Узунъ-дере.

R. acetosella L. По влажнитѣ мѣста и по ливадитѣ по Бешу-лакѣ и Синиръ-тепе.

●*Polygonum Bistorta* L. Между Батакъ и Нова-Махала.

P. Hydropper L. По влажнитѣ и крайпоточни мѣста въ политѣ на Родопитѣ.

**P. lapathifolium* L. По край поточнитѣ влажни мѣста по политѣ на Чалъ-тепе, въ Гашна-дере, Еланъ-дере, Узунъ-дере и др.

Euphorbiaceæ Juss.

Euphorbia helioscopia L. По нивитѣ и необработенитѣ мѣста между Т.-Пазарджикъ и Пещера.

E. Cyarissias L. Доста разпространено всждѣ речи по политѣ на Родопитѣ, особно по пасбищата, нивитѣ и др.

E. amygdaloides L. (*E. sylvatica* Jcq.). Въ пукнатиитѣ на канаритѣ и въ храсталацитѣ по политѣ на Гора, Анатимитѣ и изобщо по пѣтя между Югово и Павелско както и въ околноститѣ на Бачковския манастиръ.

E. Myrsinites L. По ридоветѣ между Ясж-курия и Кръчимъ.

Artocarpæ D. C.

Ficus carica L. По пѣтя между Станимака и Бачково.

Platanæ Lestb.

Platanus orientalis L. На много мѣста по течението на Бачковската рѣка. Както се вижда доста разпространено всждѣ по Родопитѣ, особно по манастиритѣ. Огромень чинаръ — се намира въ с. Бѣлащица южно отъ Пловдивъ, дебелъ въ обиколка 8.5 метра. Близу до него растѣтъ множество малки чинари.

Urticacæ E.

Urtica urens L. На много мѣста въ политѣ на Родопитѣ.

U. dioica L. Въ гората, както и по течението на Баташката рѣка, между Пещера и Батакъ.

Parietaria serbica Ранс. Между Пещера и Батакъ по сухитѣ необработени мѣста.

Cannabineæ L.

Humulus Lupulus L. По влажнитѣ мѣста въ Сливово-дере на пѣтя отъ Бачковския манастиръ за Югово. Срѣща се така сѣщо въ Дръновското дере, по течението на Бѣлишката рѣка и др. Обикновено.

Cannabis sativa L. Въ най-голѣмо изобилие видѣхъ туй растение саморасло въ запусѣлото с. Форцово. Срѣща се и на други мѣста въ диво сѣстояние.

Ulmaceæ Mirb.

Ulmus campestris Sm. Срѣща се на много мѣста въ Родопитѣ, особ. по синоритѣ на нивитѣ, като гранично дърво. Срѣща се така сѣщо и по пѣтищата. Отглеждатъ го между друго и за листници.

U. montana Sm. Между Дупница и Рила.

Celtis australis L. Тукъ-тамъ по камениститѣ терени между Югово и Павелско.

Juglandæ D. C.

Juglaus regia L. Тукъ-тамъ по течението на Бачковската рѣка. Срѣща се и на други мѣста въ Родопитѣ, дѣто е саморасло. Въ околноститѣ на с. Орѣхово го има твърдѣ много.

Cupuliferæ Rich.

Fagus silvatica L. Всждѣ между Бачковския манастиръ и Югово; започва отъ 400 м. нагорѣ. По Бешулакъ достига до 1400 м. и расте въ съдружие съ *Pinus silvestris*, *P. Laricio*, *Juniperus* и др. Срѣща се още между Лѣкавица и Крушово, надъ Ерѣкъоприя, около Студена вода (850—980 м.). Въ мѣстността Орманово покрива голѣми пространства. По низкитѣ поли на върховетѣ около Ясж-Курия. По сѣверния склонъ на върха Тѣпана западно отъ Малъ-тепе. По течението на Бѣлишката рѣка. Слабо въ Душка-дере. Грамадни дървета се срѣщатъ по Куртлуджа, между Нова-Махала и Фотинъ. Пашалийската гора на Бешулакъ сѣстои речи изключително отъ вѣковни буки. При все туй Родопитѣ не сѣ тѣй богати на букъ като балканѣтъ.

Quercus sessiliflora Slsb. По източнитѣ поли на Баба; политѣ на Анатимитѣ и Гора до 800 м. Между Лѣкавица и Крушово. По рѣдко по течението на Бѣлишката рѣка. Между Тополово и Нова-

ково. Въ Душка-дере. По склоноветѣ на Айда. По височинитѣ с.-западно отъ Студена вода (850—980 м.). По низкитѣ поли на върховетѣ около Фотинѣ, Форцово, Осиново и пр. На много мѣста придруженъ отъ *Q. Cerris* и *Q. pedunculata*, особно между Фотинѣ и Форцово.

Carpinus Betulus L. По течението на Бачковската рѣка, въ Дръновското дере, по склоноветѣ на Шилденски камѣкъ между Тополово и Новаково, по политѣ на върховетѣ южно отъ пѣтя. Въ Душка-дере разпространенъ доста много. По политѣ на Айда, около Хасковскитѣ бани, Горно Брѣстово, около Студена вода. По склоноветѣ въ клисурата между Пещера и Батакъ. Между Орманово и Форцово и пр. Срѣща се по-високо отъ *C. duinensis*. Достига до 1000 метра надъ мор. р.

Carpinus duinensis Scop. (*C. orientalis* Lam.) Твърдѣ разпространено дръво по политѣ на Родопитѣ; намѣстѣ се спуща дори до полето, както напр. при Караджиларѣ, Сърнячѣ и др. Бълг. *воденъ габеръ* — Сърнячѣ.

Corylus Avellana L. Този твърдѣ обикновенъ храстѣ вирѣе прѣимуществено по низкитѣ склонове на Родопитѣ и намѣстѣ покрива цѣли пространства. Въ Дръновското дере заедно съ *Carpinus*, *Tilia* и др.

Salicineæ Rich.

Populus alba. По пѣтя отъ Тополово за Новаково. Карааланѣ — Караджиларѣ.

P. tremula L. Въ гората между Лжковица и Крушово.

Salix alba L. На много мѣста въ подножието на Родопитѣ край пѣтищата.

S. purpurea L. Всждѣ по мочурливитѣ сѣнчести и крайводни мѣста въ Узунъ-дере и др.

S. Carnea L. По течението на р. Сушица, между Тополово и Орѣшецѣ.

**S. cinerea* L. По течението на Фотинската рѣка и недалечъ отъ моста въ Форцово.

●*S. herbacea* L. По ситѣжнитѣ каменисти поли на Попова шапка.

Salix sp. По течението на рѣката въ Узунъ-дере. Достига до 1.5 м. вис.

Betulaceæ Brtl.

Alnus glutinosa G. По притоцитѣ на р. Мечка, Между Ново-ково и Караджиларѣ. Станимака—Бачковски манастиръ и др.

A. incana Will. Въ клисурата между Пещера и Батакъ.

Coniferae L.

●*Abies pectinata* D. С. По върха Куртлуджа между Нова-махла и Фотинѣ. По върховетѣ около Ясж-Курия. По Синирѣ-тепе. Изобщо този видъ не е тѣй много застъпенъ и нийдѣ не забѣлѣ-захъ да образува цѣли гори, поне тамъ дѣто ходихъ.

●*Picea excelsa* Lnk. Въ околноститѣ на с. Дрѣново образува обширни гори, както и по склоноветѣ на Бешулакѣ. Всѣдѣ по високитѣ върхове на ю. отъ Крушово. Споредъ разказа на мѣстнитѣ помаци нѣвга тукъ е имало пространни елови гори, сега вече до-сушъ опустошени. Срѣща се по върха Куртлуджа между Нова-махала и Фотинѣ. Въ малко количество расте и по височинитѣ около Ясж-Курия. Срѣща се изобщо въ всички алпийски лѣсове по Родопитѣ.

●*Pinus Peuce* Grsb. Надъ Батакъ и по пѣтя отъ Нова-махала за Фотинѣ. Срѣща се доста много и по пѣтя отъ Сухо езеро за Срѣбско село.

P. Laricio Poir. Между Павелско и Дрѣново по върха Бешу-лакѣ въ мѣстноститѣ Марчевица, Ильовѣ-гробъ и др. До 1500 м. надъ мор. рав. По малко се срѣща речи всѣдѣ по Родопитѣ. По височинитѣ надъ Ерѣ-Кьоприя. Повече между Батакъ и Фотинѣ, дѣто покрива склоноветѣ на повечето върхова.

●*Pinus silvestris* L. По Анатимитѣ и Гора започва подъ 800 м. Срѣща се и по Синирѣ-тепе, по върха Куртлуджа, речи на поло-вината пѣть между Нова-махала и Фотинѣ. Въ околноститѣ на Ясж-Курия.

●*P. montana* Duroi. Покрива цѣли пространства по Рилскитѣ височини. По пѣтя отъ Кобилино бранище за Срѣбско село.

Juniperus Oxycedrus L. На много мѣста по Родопитѣ, надъ 400 м. в. По коритото на Бачковската рѣка и др.

●*J. communis* L. Този видъ въ Родопитѣ се срѣща по нарѣдко.

●*J. nana* Willd. По високитѣ Родопски върхове, особно по Баташкитѣ планини.

Monocotyledoneae.**Alismaceae Rich.**

Alisma Plantago. Край поточнитѣ и мочурливи мѣста всждѣ речи по политѣ на Родопитѣ.

Orchideae L.

Epipactis latifolia All. (*Serap. helleborine* L., *Ep. viridiflora* Hffm.) По сѣнчеститѣ мѣста въ гората на с. з. отъ Студена вода (850—980 м.).

●*Orchis saccifera* Brgnt. (*O. macedonica* Grsb., *O. tetragona* Neuff.). По влажнитѣ усойни мѣста въ Шарлакѣ-дере, край р. Сушица (600 м. в.) За описанието на този видъ вж. Fl. blg., 528.).

Gymnadenia conopsea Br. (*Orchis conop.* L.). Тувѣ-тамъ въ гората между Лжковица и Крушово. По ливадитѣ между Павелско и Дрѣново, особно по Циганецъ, Крайща и др.

Asparageae D. C.

Ruscus Hypoglossum L. Изъ сѣнчеститѣ мѣста въ Бачковския манастиръ. Срѣща и на други мѣста изъ Родопитѣ.

Asparagus verticillatus L. Между Станимака и Бачковския манастиръ.

●*Polygonatum verticillatum* All. Въ гориститѣ мѣста между Кобилино бранище и Плочитѣ.

Paris quadrifolia L. Въ сѣнчеститѣ мѣста изъ гората по склоноветѣ на Синирѣ-тепе.

Dioscoreae Br.

Tamus communis L. Въ гориститѣ мѣста и храсталацитѣ между Чамѣ-кория и Радоилѣ.

Liliaceae D. C.

Lilium Martagon L. Въ усойнитѣ сѣнчести мѣста изъ гората, прѣзъ която се минава за Чуката, между Дрѣново и Джурковскитѣ колиби.

Allium flavum L. Въ Лжковското дере, всждѣ изъ храсталацитѣ между Лжковица и Крушово. По политѣ на Шилденски камѣкъ.

A. carinatum L. По планинскитѣ склонове въ Шарлакѣ-дере.

A. achaïum Boiss. Въ околноститѣ на Ново-село южно отъ Родопитѣ. (Вж. Fl. blg., 561).

Juncaceae Fr.

Juncus effusus L. По блатиститѣ и мочурливи почви на много мѣста по склоноветѣ на Родопитѣ заедно съ *J. conglomeratus* L.

J. glaucus Ehrh. По мочурливитѣ мѣстности Циганецѣ, Ливадитѣ и Краища между Павелско и Дръново.

Juncus buffonus L. По влажнитѣ пѣськливи мѣста всждѣ по политѣ на Синирѣ-тепе, по течението на Бѣлишката рѣка, въ Дръновското дере, Душка-дере и др.

Luzula albida D. C. (*L. nemogosa* C.A.M., *L. Alpigena* Schur.). Въ гората между Синирѣ-тепе и Крушово. По Фотинската рѣка, около поста Форцово, Шипковица, Малѣ-тепе.

Aroideae Juss.

Arum maculatum L. Всждѣ между храстето по сѣнчеститѣ и влажни мѣста въ по-низкитѣ Родопи.

A. italicum Mill. Въ влажнитѣ мѣста между Станимака и Бачково.

Cyperaceae D. C.

Carex muricata L. Тукъ-тамъ въ дѣбовата горица между в. Узунѣ-дере.

C. vulgaris Fr. По мочуритѣ на Кобирино бранище, около Сухо езеро.

Scirpus mucronatus L. (*S. glomeratus* Scop.). Въ мочурливитѣ мѣста между Т.-Пазарджикъ и Пещера.

Gramineae Juss.

Chrysopogon Grilus Tin (*Pollnia* Gr. Spr.). На много мѣста по сухитѣ склонове на Родопитѣ.

Echinochloa crus galli P. B. (*Panicum crus corvi* L.). Всждѣ речи по влажнитѣ ливади.

Cynodon Dactylon Pers. Твърдѣ обикновено растение всждѣ.

Anthoxanthum odoratum L. Всждѣ по ливадитѣ. Твърдѣ обикн. растение, особно около селата въ подножието на Родопитѣ.

Phleum tenue Schrd. (*Ph. Bellardi* Wlld., *Ph. bulbosa* L.). Обикновено по пѣтя между Козлукъ и Карааланъ.

Alopercus agrestis L. Всѣдѣ по трѣвиститѣ мѣста и ливадитѣ.

**Cynosurus cristatus* L. Всѣдѣ по ливадитѣ между Павелско и Дръново.

C. echinatus L. Всѣдѣ по пѣтя отъ Карааланъ за Караджиларъ.

**Calamagrostis Halleriana* D. C. По сѣнчеститѣ каменисти мѣста между Фотинъ, Тилкили, Чалъ-тепе и Малъ-тепе, заедно съ *C. Sylvatica*. До сега въ Бѣлг. този видъ бѣ намѣренъ само въ Петроханския балканъ (Vel., Vs.) и Витоша (Vel.).

•*C. Sylvatica* D. C. (*Arundo Sylvatica* Schrd., *Agrostis arundin.* L.). Всѣдѣ речи по високитѣ поляни, особно по ливадитѣ въ мѣстността Крачуно, недалечъ отъ Форцово. Всѣдѣ по ливадитѣ и трѣвиститѣ скалисти панини между Фотинъ и Форцово, по политѣ на Чалъ-тепе, близу до нашия пограниченъ постъ въ мѣстността Мисимли го намѣрихъ заедно съ *C. Halleriana*.

**Agrostis Spica Venti* L. (*Apera* Sp. V. P. B.). Въ сѣнчеститѣ мѣста изъ дѣбовата гора при Студена вода надъ Новаково.

Stipa Grafiana Stev. По Кобилино бранище.

**Melica nutans* L. По голитѣ варовити скали надъ Тополово. До сега въ Бѣлг. намѣрено само въ Витоша и Пасарелъ. (Шк.).

Dactylis glomerata L. var. *hispanica* Roth. Всѣдѣ по ливадитѣ изъ Родопитѣ особно между Фотинъ и Форцово, въ Гашна-дере и др.

Bromus tectorum L. Обикн. по камениститѣ склонове на Родопитѣ.

B. sterilis L. (*B. jubatus* Ten.). Намира се речи всѣдѣ особно по сѣнчеститѣ мѣста

B. mollis L. Обикновено всѣдѣ по пасбищата, необработенитѣ мѣста и др.

B. squarrosus L. Твърдѣ разпространено растение.

B. patulus M. K. Между Малъ-тепе и Кръчимъ.

Festuca aristata C. K. (*F. gigantea* Vill.). Между Фотинъ и Форцово въ сѣнчеститѣ влажни мѣста изъ лѣсоветѣ.

Briza media L. По върха Синиръ-тепе, по политѣ на Чалъ-тепе, Шанкая, Ески-Юртъ, Шипковица и др.

Poa pratensis L. Обикновено растение по трѣвиститѣ мѣста и ливадитѣ по политѣ на Родопитѣ.

P. nemoralis L. Доста разпространенъ видъ между Караджиларъ и Сърнячъ, особно около поста, по политѣ на Св. Илия, Шафрана и около Куру-Чешме.

●*Poa Alpina* L. По Кобирино бранище.

**Aegilops ovata* L. По варовититѣ склонове на Драгойна. До сега въ Бълг. намѣрено отъ Vel. само около Царибродъ.

A. triaristata Willd. По голитѣ ридове между Дупница и Рила.

Brachypodium Sylvaticum R. S. (*B. gracile* P. B.). По гориститѣ склонове на Гора, Анатимитѣ, Кълки и пр. между Югово и Павелско. Срѣща се така сжщо по ливадитѣ между Павелско и Дръново заедно съ *Cynosurus cristatus*.

Cryptogamae vasculares.

Polypodiaceae Br.

Notholaena Marantae Br. (*Gymnogramme Marantae* Mett.). Въ пукнатинитѣ на скалитѣ на върха Драгойна.

Pteris aquilina L. На много мѣста по Родопитѣ покрива цѣли пространства. Особно много по склоноветѣ на Шиденски камъкъ.

Asplenium Trichomanes L. На много мѣста по скалитѣ въ по-низкиѣ Родопи.

A. Ruta muraria L. Тамъ дѣто и горното.

**A. Germanicum* Weiss. Въ пукнатинитѣ на скалитѣ по влажнитѣ мѣста между Лжковица и Крушово. До сега намѣрено по Синитѣ камъни до Сливенъ отъ Шк. и въ Калоферския балканъ до Голѣмо село, край р. Тѣжа, отъ Геор.

A. septentrionale Hull. Въ пукнатинитѣ на скалитѣ по върха Драгойна.

Aspidium Filix mas Sw. По сѣнчеститѣ мѣста на в. Синиръ-тепе. Достига значителни размѣри.

Cystopteris fragilis Brnh. Въ пукнатинитѣ на усойнитѣ скали между Лжковица и Крушово. Сжщо тѣй въ Шарлакъ-дере, по течението на р. Сушица. Сжщото намѣрихъ и около Сухо езеро на Кобирино бранище.

Ceterach officinarum W. По скалитѣ надъ Тополово и Синиръ-тепе, Чалъ-тепе, Драгойна и др.

Lycopodiaceae D. C.

Selaginella Helvetica Spring. Въ пукнатинитѣ на скалитѣ въ усойнитѣ мѣста между Лжковица и Крушово.

София, 11 мартъ, 1901. г.